

مرض الزهايمر أحكام عامة يبدو أن الخرف التنكسي الأولي لمرض الزهايمر هو الخرف التنكسي الأكثر شيوعا. و الثمن الذي تدفعه شائع إنه الأكثر البلدان الصناعية للزيادة المطردة في متوسط العمر المتوقع فالخرف التنكسي للخبراء فإنه يمثل ما بين 40 ٪ و 69 ٪ من جميع انواع الخرف (قدرت LTNSEE عدد المرضى ب 300000 في فرنسا في عام 1986 وهذا الرقم لم يتوقف بل كان في زيادة مستمرة) وقد أجريت البحوث الجينية والكيميائية العصبية والنفسية العصبية في السنوات الأخيرة ، نتيجة للوعي بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية لمرض الخرف التنكسي ، فقد كان عند هذه الفئة الأكثر تطورا و بسرعة كبيرة ، و في بعض الأحيان بل يتم التعامل معها بشكل عادي من طرف الأسرة ، و بعض الحالات ال تمثل سوى نسبة 1% في الحالات التي تستلزم المستشفى في بيئة الطب النفسي ، فهو مرض قاتل مزمن ، يعطل بشكل خطير ويعطل استقاللية المريض و المرافقين لهم لسنوات عديدة ففي 76-77 ، الكولين أسيتيل ترانسفيراز. وجد أن هذا العجز يتناسب مع شدة الخرف.