

● حمى التيفوئيد (typhoid fever) (تنتشر من خلال الغذاء والماء الملوث ، علامات التيفوئيد وأعراضه عادة ما تشتمل على : - ● ارتفاع عال في درجة الحرارة ● صداع ● ألم بالبطن ● الإصابة بإمساك أو إسهال ● عند تلقي العلاج من المضادات الحيوية ، ونسبة صغيرة هي التي تتعرض للموت لاصابتها بمضاعفات المرض . التطعيمات الوقائية ضد مرض التيفوئيد متاحة ، لكنها فعالة بشكل جزئي . ● وتكون مخصصة أكثر للأشخاص التي تكون عرضة للإصابة بالبكتيريا أو التي تسافر إلى أماكن منتشرة فيها التيفوئيد ● على الرغم من أن الأطفال - في بعض الأحيان - قد تظهر عليها الاعراض فجأة ، إلى أن . غالباً العلامات والاعراض تتطور تدريجياً غالباً الاعراض ماتظهر في خلال أسبوع إلى ثلاثة بعد التعرض للبكتيريا ، في بعض الحالات قد تطول المدة و ال يظهر المرض إلى بعد مرور شهرين من التعرض والاصابة بالبكتيريا . كيفية حدوث المرض ؟ تخترق بكتريا السالمونيلا الامعاء الدقيقة وتدخل في تيار الدم ثم تحمل بواسطة كرات الدم البيضاء للكبد والطحال والنخاع . ثم بعد ذلك تهاجم البكتيريا المرارة والقنوات المرارية والغدد الليمفاوية الخاصة بالامعاء ثم تتكاثر بأعداد كبيرة جداً ثم تتجه إلى الامعاء . ويمكن في هذه المرحلة اكتشاف البكتيريا عند عمل مزرعة للبراز في المعمل أعراض التيفوئيد:المرحلة الاولى : بمجرد ظهور الاعراض ،سخونة مرتفعة جداً ، بحيث تصل درجة حرارة الجسم إلى 39 أو 40 درجة مئوية) 103 أو 104 درجة فهرنهايت (● صداع ضعيف ● وإرهاق ● ألم في البطن ● إسهال أو إمساك. ● طفح غالباً الأطفال الاسهال ، في حين أن الكبار البالغين يصابوا بالامساك الحاد . خلال الاسبوع الثاني ، قد تظهر علامات من الطفح المتمثل في صورة بقع صغيرة مسطحة لونها وردي على المنطقة السفلية من الصدر وأعلى البطن ،