

Definition : L'eventration est le passage d'un organe le plus souvent l'intestin, a travers une cicatrice sur la paroi abdominale, elle rassemblement a des masses indolores et reductible, elle a tendance a augmenter de taille avec le temps sous l'effet de la pression abdominale comme un ballon qui se gonfle. la patiente kerrar touhfa , agee de 63 ans , operee le 22/02/2024 pour une eventration sus ombilicale non compliquee collet de 61 mm _ Incision mediane sus ombilicale _ Exploration defect parietal de 6cm donnant issu a un sac herniaire a contenu epiploique d'aspect viable _ Liberation du sac et sa resection _ Omentectomie partielle _ Ablation d'un nodule aponevrotique posterieure _ Fermeture aponevrotique Conclusion : L'eventration survient apres une operation abdominale si la suture interne au niveau de la paroi musculaire ne cicatrise pas comme il faut. Malade n= 02 : Il s'agit de kaarar touhfa agee de 36 ans mariee , femme de foyer , hospitalisee le 21/02/2024 au notre service pour une Eventration apres l'apparition des : tumefaction sus ombilicale non etranglee reductible impulsive a la toux + apyretique ATCD : hernie ombilicale operee en 1990 Kc de VB operee en 2021 ayant beneficie d'une cholecystectomie + bisegmentectomie admise pour eventration sus ombilicale non compliquee ECHO : eventration sus ombilicale non compliquee collet de 61 mm TDM : deux bourgeons charnus du fond de la vesicule + 2 ADP du pedicule hepatic . Medicaux : operee en 2016 pour hernie ombilicale ayant beneficie d'une hernioraphie reprise la mm annee pour une eventration ombilicale ayant beneficie de hernioplastie Examen digestif : ISPECTION : incision mediane sus et sous ombilicale LA PALPATION : eventration ombilicale de 20 et 10 mm + abdomen souple indolore Examen paraclinique : Elle a fait une echographie le 02/11/2023 eventration de la paroi abdominale mediane avec 2 collets ombilicale a 13 mm et sus ombilicale a 24 mm sans signes de souffrance. Les deux examens utiles dans ce cas sont l'echographie qui, via l'utilisation d'ultrasons, permet de visualiser l'eventration et le scanner abdominal parietal qui lui, via l'utilisation de rayons X, permet d'obtenir des coupes de l'abdomen en 3D et donc d'observer egalement cette eventration. Une intervention chirurgicale est alors necessaire en ?? .urgence. ATCD : ? Anamnese