

مستويات واتجاهات معدل الخصوبة حسب العمر (ASFR) لكل امرأة 1000 ومعدل الخصوبة الكلي (TFR) لكل امرأة في عُمان بين عامي 1988 و2000. 6 ولادة لكل امرأة عام 1988 إلى 4. 8 ولادة لكل امرأة عام 2000، 8 ولادة لكل امرأة خلال فترة قصيرة بلغت 12 عاماً. انخفضت الخصوبة بنسبة 44% خلال 12 عاماً، 7% سنوياً بين عامي 1988 و2000. على مدى فترة سبع سنوات من عام 1988 إلى عام 1995، انخفض معدل الخصوبة بمقدار 1. انخفض بمقدار 2. تشير معدلات الخصوبة حسب العمر إلى ارتفاع الخصوبة بين النساء العمانيات مع ذروة واسعة تمتد إلى سن 20 إلى 39 عاماً. تحدث ذروة الخصوبة بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 و 29 عاماً، تليها عن كثب النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 30 و 34 عاماً (الشكل 2). يوضح تحليل معدلات الخصوبة حسب الفئة العمرية أنه بين عامي 1988 و 2000، انخفضت الخصوبة بشكل مطرد في جميع الفئات العمرية باستثناء 40 إلى 49 عاماً (الجدول 1 والشكل 3). يكون انخفاض الخصوبة أكثر وضوحاً بين الشباب اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 عاماً. أنجبت 220 امرأة لكل 1000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 15 و 19 عاماً في ذلك العام. أنجبت 383 امرأة لكل 1000 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و 24 عاماً. يختلف نمط انخفاض الخصوبة بين النساء في الثلاثينيات (30-39 عاماً) اختلافاً كبيراً عن نمط انخفاض الخصوبة بين النساء الأصغر سناً (الشكل 3). ولكن بمعدل أكثر اعتدالاً بكثير من معدل انخفاض الخصوبة بين النساء الأصغر سناً (29 عاماً أو أقل). اللاتي تتراوح أعمارهن بين 40 و 49 عاماً، بين عامي 1988 و2000. وارتفع هذا الرقم إلى 136 لكل 1000 امرأة في عام 2000. انخفضت المساهمة النسبية في إجمالي الخصوبة للنساء دون سن 25 عاماً من 35% في عام 1988 إلى 16% في عام 2000؛ زادت المساهمة النسبية في إجمالي الخصوبة للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 25 عاماً فأكثر بشكل كبير خلال هذه الفترة. ويتضح التحول في توقيت الخصوبة نحو الأعمار الأكبر أيضاً مع زيادة متوسط سن الإنجاب من 29 عاماً في عام 1988 إلى 32 عاماً في عام 2000. إن الزيادة النسبية في الخصوبة بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 30 عاماً فأكثر بعيدة كل البعد عن أن تكون كافية لتعويض معدل الانخفاض بين النساء الأصغر سناً. بين عامي 1988/1989 و2000، انخفضت معدلات الخصوبة في جميع الفئات العمرية باستثناء الفئة العمرية 45-49 عاماً،