

RESULTATS ET DISCUSSION Les caractéristiques hygienogrammes des 15 bâtiments avicoles dans la zone d'étude (AinTouta) sont présentées dans le tableau 10 et la figure 40 Les éléments de mesure d'hygiene montre que : –la sécurité sanitaire des poussins est trop bas en pourcentage 6.66% due à l'absence d'utilisé les examens bactériologique de fonds de boites qui peut aboutit à des pertes importantes ultérieurement –La sécurité vis-à-vis des vecteurs contaminants est faible et non acceptable 47% dans la zone étudié on a noté qu'il n'ya aucun sas sanitaire en deux secteurs 0% mais une élevée pourcentage de nettoyage et désinfection 80%, En outre les lavabos presque ne fonctionnent pas 13%, aussi une absence des cottes bottes coiffes pour visiteurs 6.66%, malgré l'application de pédiluve 93% en remarque un pourcentage plus élevés par rapport aux autres éléments ou la majorité des éleveurs respectent les chemines de marche unique soit pour les personnes, le matériel ou bien pour la sortie et l'entrer des poussins 93,33% Peu d'éleveurs accordent de l'importance à la lutte contre les oiseaux sauvages 26.66%, contrairement à leur volonté de lutter contre les rongeurs 60.66, qui les menacent davantage. L'entrée des animaux de domestiques est de 40%, à cause de faible utilisation de la clôture 26.66% Aucun stockage du fumier à risque 0%, aussi la meme chose pour le périmètre propre destiné au station des véhicules 0% On a remarqué que les eleveurs n'ont pas de aire de lavage recordée à la fosse 6.66% alrs absence des fosses de récupération des eaux de nettoyage 0% Tous les bâtiments ont des gouttière le long des bâtiments 100%, et la pluparts d'eux ont des fossés le long du bâtiment 93.33% –pour la scurité sanitaire vis-à-vis du voisinage malheureusement elle est nul Le stockage des cadavres est de faible pourcentage 26.66%, Cela est dû à leur utilisation de la méthode d'incinération pour l'élimination totale de tout un risque infectieux La vérification d'eau potable depuis 6mois souvent non appliqué 20%, Generalement les eleveur réservent une place spéciale pour la litière neuve 66.66% pour assurer le confort et l'hygiene d'elevage personne ne fait attention au le vent dominant par apport à une autre établissement avicole Conclusion On peut donc déduire de cette étude qu'il ya un absence de respect des normes hygiéniques dans les bâtiments de la région étudié, aussi l'ignorance des éleveurs et leur méconnaissance des modes de transmission des agents pathogènes expliquent leur manque d'intérêt et d'application de toutes les normes d'hygiène nécessaires à la protection de leurs élevage, ça ce qu'il empêche le développement de ce domaine et aboutit à des pertes économiques importantes Les eleveurs doivent être éduqués sur les dangers pour leurs poulets ; L'importance des éléments nécessaires pour assurer le succès de leur troupeau et éviter au maximum les pertes. Cela les motive également à respecter les règles d'hygiène et de prévention qui sont à la base du succès Les améliorations dans les différents domaines (éducation de l'éleveur, programme de biosécurité, conduite de l'élevage) permettront l'amélioration de la production ainsi que l'augmentation .du revenu de l'exploitant