

1. التشخيص عند الأطفال الصغار • فحص النمو العام أثناء فحوصات صحة الطفل يجب أن يتلقى كل طفل فحوصات صحة الطفل مع طبيب أطفال أو مقدم رعاية صحية في مرحلة الطفولة المبكرة. توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بأن يتلقى جميع الأطفال فحصاً للتأخر في النمو خلال زيارتهم لرعاية الأطفال في الأعمار 9 و18 و24 أو 30 شهراً، . قد يتلقى الطفل فحصاً إضافياً إذا كان لديه احتمالية أكبر للإصابة باضطراب طيف التوحد أو مشاكل في النمو. يشمل الأطفال الذين لديهم احتمالية أعلى للإصابة باضطراب طيف التوحد أولئك الذين لديهم أحد أفراد الأسرة مصاب باضطراب طيف التوحد، أو يظهرون بعض السلوكيات النموذجية لاضطراب طيف التوحد، قد يطرح مقدم الرعاية الصحية أسئلة حول سلوكيات الطفل ويقوم تلك الإجابات جنباً إلى جنب مع المعلومات من أدوات فحص اضطراب طيف التوحد والملاحظات السريرية للطفل. من المهم اكتشاف وتشخيص الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد بدقة في أقرب وقت ممكن، O تقييم القدرات المعرفية للطفل O تقييم القدرات اللغوية للطفل O محادثة متعمقة مع مقدمي الرعاية للطفل حول سلوك الطفل ونموه