

الإعاقة: الجوانب النفسية والاجتماعية ومع ذلك، هناك أدلة على أن العوامل النفسية والاجتماعية يمكن أن التنبؤ وربما التأثير على الإعاقة غير المبررة من قبل الفيزيولوجيا المرضية الأساسية. هذه المقالة يدرس الرنوديلات التفسيرية والتنتبؤات النفسية والاجتماعية وعواقب الإعاقة، تعرف منظمة الصحة العالمية الإعاقة في دولتها تصنيف نموذج الإعاقة والإعاقة والإنابة (ICIDH) على أنه "أي فإن الإعاقة هي مصطلح يستخدم على نطاق واسع في كل من الكلام اليومي والأفراد في التخصصات الأكاديمية والتطبيقية بالإضافة إلى الطب بما في ذلك علم النفس وعلم الاجتماع والعلاج الطبيعي والعلاج المهني وأقتصادات الصحة وأبحاث الخدمات الصحية. شكاوى العين وأمراض الدورة الدموية وشكاوى الجهاز العصبي (على سبيل المثال السكتة الدماغية). مع ما يقرب من 70٪ من البالغين المعاقين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما. مثل الأكل، تم تحديد قيمة كل عنصر من خلال تقييمات القضاة. يتناقض هذا مع التدابير المتوسطة أو المضافة التي تحمل يعني ضمناً أن العديد من الإعاقات الخفيفة، ١٩٩٣ أتصور النموذج الاجتماعي للإعاقة الإعاقة من حيث القيود المفروضة على الفرد بسبب القيود في البيئة الاجتماعية والمادية ويقترح ذلك يتم تحديد القيود الوظيفية اجتماعياً بقدر ما يتم تحديدها بيولوجياً، نماذج علم النفس تصور الإعاقة كبناء سلوكي (على سبيل المثال جونستون، توقعت العوامل النفسية تبايناً أكبر في ADL بعد 3 سنوات من الضعف ومقاييس شدة المرض. بيئه بها عوائق أمام التنقل أو حماية اجتماعية مفرطة قد تقلل البيئة من ثقة الفرد مما يؤدي إلى أن أنشطته تصبح أكثر محدودية. تم تعديل ICIDH مؤخراً للسماح بإمكانية ذلك قد تتأثر الإعاقة بعوامل أخرى غير الهيكل والوظيفة (منظمة الصحة العالمية، ومع ذلك فإن نموذج ICIDH 1998) غامض حول العوامل النفسية والاجتماعية التي تساهم في الشرح بالضبط، ١٩٨٤ العاطفية غالباً ما لاحظ علماء النفس العلاقة بين الإعاقة وانخفاض المزاج أو الاضطراب العاطفي وهذا هو عادة ما يتم تفسيره على أنه عواقب عاطفية للإعاقة (على سبيل المثال تيرنر ونوه، في دراسة طويلة لمجتمع منتصف العمر وكبار السن - وجد السكان، ميكس وآخرون 2000) أن الاكتئاب تنبأ بالإعاقة الوظيفية أكثر من الإعاقة التنبؤ بالاكتئاب. فحص كابلان وآخرون (1984) صيانة التمريرين ووجدوا أن التغيرات في الكفاءة الذاتية ارتبطت بالتغييرات في نشاط المشي لدى المرضى الذين يعانون من مرض الانسداد الرئوي المزمن. أي حل مشكلة. هذه التمثيلات العقلية يقترح التأثير على التعامل مع كل من الحالة الموضوعية والعاطفية رد فعل على الحالة. ٥.١ العوامل الاجتماعية ولكن قد يكون ذلك بسبب المطالب الاجتماعية المختلفة على المرضى في سياقي الرعاية: الممرضات لـ 3 مساعدة المرضى في إنجاز المهام، وكذلك أكثر بعدها جهات الاتصال. شبكة صغيرة بعد وقت قصير من التشخيص توقع انخفاضاً أكبر في التنقل خلال العام التالي (إيفرز وآخرون، كلاهما مرتبط بالنتائج الصحية والسلوك. ربما تكون النماذج الأكثر استخداماً في الدراسات النفسية للإعاقة استكشف تأثير الإعاقة على الأداء العاطفي.