

Lexotan 2017 يحتوي على العنصر النشط برومازيپام. ينتمي Lexotan إلى مجموعة من الأدوية تسمى البنزوديازيبينات التي يعتقد أنها تعمل من خلال عملها على المواد الكيميائية في الدماغ. يستخدم Lexotan للقلق والتوتر أو التحريض. بشكل عام ، يجب أن تؤخذ البنزوديازيبينات مثل Lexotan لفترات زمنية قصيرة فقط (على سبيل المثال 2 إلى 4 أسابيع). لا ينصح بالاستخدام المستمر على المدى الطويل إلا إذا نصح طبيبك. هذا الدواء قد يكون الادمان. لا يتوفر هذا الدواء إلا بوصفة الطبيب تظهر خصائص مهدئ ومريح للاسترخاء. العنصر النشط هو برومازيپام. التلك (553) ، (iii) (172) (CI 77492)). أقراص Lexotan خالية من الجلوتين. نصيحة الجرعة: كيفية استخدام Lexotan قبل أن تأخذ Lexotan البنزوديازيبينات الأخرى أو أي مكونات مدرجة هنا. طفق جلدي أو حكة أو خلايا على الجلد ؛ كنت تعاني من توقف التنفس أثناء النوم (توقف مؤقت في التنفس عند النوم) ؛ لديك مرض ضعف العضلات المعروف باسم الوهن العضلي الوبيل. الحزمة ممزقة أو تظهر علامات العبث ؛ فقد لا يعمل بشكل جيد. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كنت يجب أن تأخذ عقار ليكسوتان ، قبل البدء في تناولها: يجب أن تعرف طبيبك عن كل ما يلي قبل البدء في تناول Lexotan. أخبر أنك الطبيب إذا: لا ينصح Lexotan للاستخدام في النساء الحوامل. ستناقش طبيبك مخاطر وفوائد استخدام Lexotan إذا كنت حاملاً أو تخطط للحمل ؛ أنت ترضعين طفلك أو ترضعين طفلك. لديك أي مشاكل صحية أخرى ، خاصة ما يلي: أمراض الكبد أو الكلى أو الرئة. ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم. لديك ارتفاع الضغط في العين (الجلوكوما) ؛ تشرب الكحول بانتظام. الكحول قد يزيد من آثار Lexotan. إذا لم تخبر طبيبك عن أي مما ذكر أعلاه ، تناول الأدوية الأخرى أخبر طبيبك إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى ، قد تتداخل بعض الأدوية مع Lexotan. تشمل هذه الأدوية: أقراص النوم الأخرى أو المهدئات أو المهدئات ؛ أدوية أخرى للقلق. الأدوية للسيطرة على نوبات (الصرع) ؛ بعض الأدوية المستخدمة لعلاج الحساسية ونزلات البرد. مسكنات الألم مرخيات العضلات عقاقير مخدرة؛ بعض الأدوية المستخدمة لعلاج الالتهابات البكتيرية. بعض الأدوية المستخدمة لعلاج أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم. السيميتيدين - دواء يستخدم لعلاج القرحة. قد تتأثر هذه الأدوية بكزوتان ، أو قد تؤثر على مدى فعالية ليكزوتان.