

خضع ما مجموعه 20 مريضا مصابا بالشلل الشديد (جميع المرضى عشوائيا) للختان دون تحضير بواسطة مراكز التخثر. من بين 16/20 تم الإبلاغ عن زيادة النزيف بعد الختان وتم تحويل جميع هؤلاء الأطفال حديثي الولادة لفحص الطبيب. تطلب النزيف دخول المستشفى في العناية المركزة أو تلقي عمليات نقل دم. ثمانية مرضى يعانون من نزيف خفيف ومعتدل خضعوا للختان دون تحضير بمراكز التخثر، 5/8 تعرضوا لزيادة النزيف بعد الختان، احتاج مريض واحد إلى نقل دم وإدخاله إلى المستشفى في العناية المركزة. من بين 6/21 من المرضى الذين عانوا من زيادة النزيف بعد التحالف (منهم، 16 مريضا يعانون من فقر الدم الشديد وخمسة مرضى آخرين يعانون من فقر الدم الخفيف)، تم إعطاء حوالي 2/6 من مصدر التأخير علاجاً موضعياً (لعدة أيام) بواسطة النسغ قبل إحالتهم إلى المستشفى للتحقيق. كان مصدر التأخير التشخيصي هو عدم إجراء اختبار aPTT أو تجاهل نتيجة aPTT المطولة، بما في ذلك مريضان خلال فترة الدراسة، في تسعة من المرضى (بما في ذلك 21/6 الذين نزفوا تتراوح من أربعة أشهر إلى أربع سنوات ونصف).