

تم استخدام المنهجية النوعية وتصميم الدراسة الظاهرية للحصول على النتائج الفردية من خلال المقابلات مع المشاركين [16]. كانت الدراسة استقرائية وتهدف إلى اكتشاف وتفسير تجارب النساء اللائي قدمن BP في مستشفى ثالث في نظام الصحة العامة في الأندلس (إسبانيا). تم وصف تجاربهم بالتفصيل ، ثم تم إجراء تحليل شامل للمقابلات لفهم تجارب هؤلاء النساء ومشاعرهن. تم اختيار العينة من خلال أخذ العينات غير الاحتمالي والمتعمد والمريح ، حيث تم اختيار الأمهات اللواتي يرغبن في التعاون ويرغبن في مشاركة خبراتهن ومشاعرهن. تم تحديد حجم العينة من خلال التشبع النظري. استخدمنا تقنية كرة الثلج أو أخذ العينات المتسلسلة. من خلال الاتصالات التي قدمها المشاركون الأوائل ، وجدنا نساء أخريات على استعداد للمشاركة. شارك 7 مشاركين في الدراسة. على الرغم من صغر حجمها ، كافية لمعالجة الفئات المواضيعية في الدراسة. يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن الالتزام بخطة الولادة كان منخفضاً جداً ، سواء في البلد أو في مكان الدراسة نفسه ، وأن حوالي 5 ٪ فقط من النساء تم تقديم خطة الولادة أخيراً في مستشفى الدراسة. شملت الدراسة أيضاً النساء اللواتي أنجبن في الأشهر الثلاثة السابقة لجمع البيانات والذين قدموا ضغط الدم. أعرب جميع المشاركون على وجه التحديد عن اهتمامهم بالمشاركة. تم جمع البيانات خلال شهري فبراير ومارس 2018. تم إجراء مقابلات شبه منظمة بنص محدد مسبقاً يحتوي على 11 سؤالاً ، والتي تم استخدامها بمرونة اعتماداً على كيفية تطور الحوار. تم إعطاء المشاركين ورقة موافقة مستنيرة. استغرقت المقابلات ما بين 15 و 20 دقيقة وأجريت في غرفة استشارة ممرضة في مركز صحي ، وحضرها جميع المشاركون عند مشاركتهم في ورشة عمل حول الرضاعة الطبيعية. تم تسجيل جميع الجلسات بالصوت ، تمت معالجة البيانات عن طريق تحليل المحتوى الذي يتضمن أربع مراحل: النسخ والاختزال والتدوين والتصنيف ،