ولكن يمكن للعلاج أن يبطء أو يوقف نمو اللويحات، ومراجعة الطبيب لتحديد الخيار العلاجي المناسب بين العلاج الدوائي أو الجراحي أو كلاهما حسب حالته. وفيما يأتي توضيح لخيارات علاج تصلب الشرايين المتعددة: [1, تغير نمط الحياة: وذلك بتناول غذاء صحي، العلاج الدوائي: يمكن استخدام بعض الأدوية للمساعدة في إبطاء تطور تصلب الشرايين، أدوية التحكم بمستوى الكوليسترول: يمكن للأدوية الخافضة للكوليسترول كالستاتينات (بالإنجليزية: Statins) والفايبرات (بالإنجليزية: Fibrates) أن تساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار، الأدوية المضادة للصفائح الدموية (بالإنجليزية: Antiplatelet Medications): يكمن دور هذه الأدوية كدواء الأسبرين في تقليل خطر تجمع الصفائح الدموية، حاصرات بيتا (الإنجليزية: Beta Blockers): تساعد حاصرات بيتا على خفض معدل ضربات القلب وضغط الدم، كما تساعد هذه الأدوية على خفض خطر الإصابة بنوبة قلبية وبعض مشاكل عدم انتظام ضربات القلب. حاصرات قنوات الكالسيوم (بالإنجليزية: Calcium channel blockers) تستخدم حاصرات قنوات الكالسيوم لخفض ضغط الدم، مدرات البول (بالإنجليزية: Diuretics): تساعد مدرات البول على خفض ضغط الدم عن طريق تقليل احتباس السوائل في جميع أنحاء الجسم. العلاج الجراحي: ويلجأ الأطباء لها في حال انسداد أحد الشرايين الذي يهدد صحة أحد الأعضاء، الرأب الوعائي وتركيب دعامة (بالإنجليزية: Angioplasty and Stent Placement): وتعرَف باسم القسطرة القلبية، استئصال باطنة الشريان (بالإنجليزية: Endarterectomy): وذلك لإزالة الترسبات المتراكمة على الجدران جراحيًا. العلاج الحال للفبرين (بالإنجليزية: Fibrinolytic Therapy): وعلى الرغم من استعمال الأدوية المذيبة للتجلط،

lakhasly.com © تم تلخيص النص بواسطة موقع لخصلي