

لا تظهر على العديد من مرضى كوفيد 19 أي أعراض، يمكن أن يؤدي كوفيد 19 إلى الحاجة إلى الرعاية في المستشفى أو إلى الوفاة. غالباً ما تظهر الأعراض المعتادة لكوفيد 19 بعد مدة تتراوح بين يومين إلى 14 يوماً من التعرض للفيروس. حتى لو كانت نتيجة اختبار كوفيد 19 إيجابية. لا تظهر أعراض كوفيد 19 لدى العديد من الأطفال الذين تثبت إصابتهم بكوفيد 19. قد يكون مرض كوفيد 19 خفيفاً أو معتدلاً أو شديداً أو حرجاً. في حالات كوفيد 19 المعتدلة، في حالات كوفيد 19 الشديدة، يحدث مرض كوفيد 19 بسبب العدوى بفيروس المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة كورونا 2، عندما يسعل مرضى كوفيد 19 أو يعطسون أو يتنفسون أو يغنون أو يتحدثون، قد تكون أنفاسهم موبوءة بكوفيد 19. يمكن أن يَضْعُفُ دفاع الجسم ضد فيروس كوفيد 19. عوامل الخطورة الرئيسية المرتبطة بالإصابة بكوفيد 19 هي: شخصاً مصاباً بكوفيد 19. هناك عدة عوامل تؤثر على خطورة الإصابة بالفيروس المسبب لكوفيد 19. فإنه ليس من الشائع التعرض لعدوى كوفيد 19 في أماكن مثل الحمامات العامة. لا يعرف العلماء جميع العوامل المرتبطة بحالات كوفيد 19 الخطيرة. يمكن أن تشمل مضاعفات حالات كوفيد 19 الشديدة ما يلي: وعادةً يُطلق على هذه المتلازمة اسم كوفيد طويل الأمد، أو متلازمة ما بعد كوفيد 19. وقد تسمى أحياناً كوفيد 19 الممتد، أو حالات ما بعد كوفيد، قد يساعد الحصول على لقاح كوفيد 19 على الوقاية من الإصابة بمتلازمة ما بعد كوفيد 19. يمكن للقاح كوفيد 19 أن يقلل من خطر الوفاة أو الأعراض الخطيرة الناجمة عن كوفيد 19. لقاحات كوفيد 19 المتوفرة في الولايات المتحدة هي: لقاح فايزر-بيوانتيك لكوفيد 19 لعام 2023-2024. بالنسبة لمن لم يتلقوا أي جرعة لقاح مضاد لكوفيد 19 لعام 2023-2024، لقاح موديرنا لكوفيد 19 لعام 2023-2024. بالنسبة لمن لديهم جهاز مناعي طبيعي: بالنسبة لمن لم يتلقوا أي جرعة لقاح مضاد لكوفيد 19 لعام 2023-2024، لقاح نوفافاكس لكوفيد 19 لعام 2023-2024. بالنسبة لمن لديهم جهاز مناعي طبيعي: بالنسبة لمن لم يتلقوا أي جرعة لقاح مضاد لكوفيد 19 لعام 2023-2024، يمكن لفريق الرعاية الصحية مساعدتك في الحالات التالية: للوقاية من كوفيد 19 لدى بعض الأشخاص المصابين بضعف جهاز المناعة. حاول أن تُعوّد نفسك على ما يلي: اختبر عدوى كوفيد 19. إذا ظهرت عليك أعراض كوفيد 19،