

يتناول هذا المقال دراسة الفهم الشفهي عند الأطفال المصابون بالشلل الدماغي بحيث تهدف دراستنا هذه إلى التعرف على مدى إصابة أو اضطراب الفهم الشفهي عند الأطفال المصابين بالشلل أثناء الولادة وبعد اكتساب الفهم واتخدنا في دراستنا حاليتين تراوح أعمارهم بين ٦ إلى ٧ سنوات للكشف عن مستوى أو درجة الفهم الشفهي التي يستعملونها بحيث يختلفون في سبب الإصابة وفترة الإصابة الحالة الأولى أصيبت بنقص الأكسجين مما أدى بـشلل الدماغي والحالة الثانية أصيبت بالشلل بعد الولادة بـ ١١ شهر بمرض السحايا . إعادة التأهيل الوظيفي وهران واعتمدنا على منهج دراسة حالة وذلك من خلال تطبيق اختبار الفهم الشفهي ٥٢ لعبد الحميد خومسي ولقد أثبتت نتائج دراستنا أن الإصابة تؤثر على الفهم الشفهي وذلك عائد إلى المواظبة على كل خطأ كلمات مفتاحية : الشلل الدماغي الفهم الشفهي ، الفهم الفوري ، الفهم الكلي ، اختبار الفهم الشفهي ٥٢