

تلخيص : جميع أنواع الحباري نشأت في إفريقيا، وتوجد 21 من أصل 25 نوعاً هناك. نشأت في مركزين رئيسيين هما القرن الأفريقي ونهر النيل فوق بحيرة فيكتوريا وجنوب نهر الزامبيزي. من المحتمل أن التقلبات المناخية أدت إلى انقراض محلي، حيث توجد أسلاف الحباري المعروفة باسم "الحباري القديمة" (pre-chlamydoti) شمال نطاق انتشارها الحالي. يطلق عليها اسم "bustards" وهي كلمة لاتينية تعني "المشي" حيث يفضلون المشي على الطيران. تنتشر الحباري حالياً من جزر الكناري في المغرب إلى منغوليا في الشرق، وتنقسم إلى نوعين: الحباري الكناري والحباري الآسيوي. يتمتع حباري الكناري بحجم صغير وريش داكن، بينما الحباري الآسيوي أثقل وزناً وأفتح لوناً. حباري شمال إفريقيا متوسط بينهما في اللون والحجم. تُعرف بعض أنواع الحباري بالأسماء التالية: الحباري اليمنية، الحباري الآسيوية، الحباري المهاجرة. تُعرف الحباري أيضاً باسم "الحبرو" في دول أفريقيا وهي معرضة للخطر بسبب الصيد المفرط. تُعرف الحباري بخجلها وتجنبها للصوت. تتشابه بيوض الحباري مع لون الأعشاش الصحراوية، مما يوفر لها تمويهاً من الحيوانات المفترسة. تُقضي معظم وقتها على الأرض بحثاً عن الطعام مثل البذور والحشرات والكائنات الصغيرة.