ينتمي ديكلوفيناك الصوديوم إلى نوع من الأدوية يسمى مضادات الالتهاب غير الستيرويدية (بالإنجليزية: Non Steroidal Anti-inflamatory Drugs), وهو يعمل على تثبيط أنزيمات الأكسدة الحلقية التي تساعد على صنع مواد كيميائية في الجسم تسمى البروستاجلاندين، والتي تفرز في مواقع الإصابة وتسبب الألم يستخدم ديكلوفيناك الصوديوم ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية بشكل عام لخفض درجة الحرارة، يمنع استخدام هذا الدواء في الحالات التالية: المعاناة من الحساسية اتجاه أي مكون من مكوناته أو من مضادات الالتهاب غير الستيرويدية بشكل عام، تشمل احتياطات استخدام ديكلوفيناك الصوديوم ما يلي: قد يستغرق العلاج أسبوعين من الاستخدام المنتظم حتى يشعر المريض بالتحسن إذا كان يعاني من التهاب المفاصل. يجب الامتناع عن تناول الكحول طيلة فترة العلاج بهذا الدواء لأنه قد يزيد من خطر الإصابة بنزيف في المعدة. وأيضاً في حالة المعاناة من الأمراض التالية: أمراض القلب والأوعية الدموية يمنع استخدام ديكلوفيناك خلال فترة الحمل خاصة في الشهور الثلاثة الأخيرة، يجب إخبار الطبيب أو الصيدلي عن جميع الأدوية، كما يجب عدم التزامن مع العلاجات الآتية: حيث تعمل على زيادة معدل تميع الدم، وأدوية خفض ضغط الدم، لكن بشكل عام الجرعات كالتالي: الجرعة العامة من ديكلوفيناك الصوديوم هي 75 ـ 150 ملغ يومياً مقسمة على جرعتين أو 3 جرعات. الجرعة اليومية القصوى الموصى بها من ديكلوفيناك الصوديوم هي 150 ملغ. الجرعة الموصى بها للتخفيف من هشاشة العظام هي 50 ملغ مرتين أو 3 مرات في اليوم، أو 75 ملغ مرتين في اليوم. الجرعة الموصى بها للتخفيف من التهاب المفاصل الروماتويدي هي 50 ملغ 3 أو 4 مرات في اليوم، أو 75 ملغ مرتين في اليوم. أقراص قابلة للإنتشار 50 مغ يجب اتباع الإرشادات التالية عند استخدام هذا العلاج: تؤخذ أقراص ديكلوفيناك الصوديوم عن طريق الفم مع أو بدون طعام.

lakhasly.com © تم تلخيص النص بواسطة موقع لخصلي