المغص ومن حيث التعريف، لثلاثة أيام في الأسبوع، وعلى مدى ثلاثة أسابيع على الأقل. عندما يبكي الطفل يبدو أنه يعاني من ألم في البطن، وقد يتصاحب ذلك مع سحب القدمين إلى البطن. ويبدأ المغص بشكل نمطي في الأسابيع القليلة الأولى من عمر الطفل، ويحدث في الأغلب في المساء. ويعتبر المغص مشكلة شائعة تدفع أسرة واحدة من بين ست أسر إلى استشارة خبير صحي للحصول على المشورة، نظراً إلى ما تسببه هذه المشكلة من ضيق وقلق حقيقيين. كما هو معروف، كما أنه ليس نتيجة أي خطأ في رعاية الأهل. فببساطة، قد يكون من الطبيعي أن يبكي بعض الأطفال قليلاً بينما يبكي آخرون كثيراً. إطلاق الريح، أو حساسية مفرطة عابرة من اللاكتوز، وهو السكر الطبيعي الموجود في الحليب. التعامل مع المغص قد تكون طمأننة الأهل أن الطفل غير مريض، وأن المغص سيتوقف خلال أشهر قليلة، أو متوعكا، أو منزعجا . ومن غير الضروري التحول من الرضاعة الطبيعية إلى زجاجة الرضاعة، أو الانتقال من تركيبة حليب إلى أخرى في حال اعتماد الرضاعة عن طريق الزجاجة. ولا تكون الأدوية المستخدمة