

تأخر النطق (بالإنجليزية: Language Delay) عند الأطفال هو تأخر تطور أو استخدام الميكانيكيات التي ينتج عنها النطق حيث ينخفض مستوى وضوح، تعقيد ومفردات الكلام عن الحد الطبيعي الملائم للمرحلة العمرية للطفل. يُعد تأخر النطق مشكلة شائعة تؤثر في 3-10% من الأطفال كما أنها تشيع بمقدار 3-4 أضعاف عند الذكور مقارنة بالإناث. يعد تأخر النطق نوع من اضطراب التواصل، ويمكن أن يشخص تأخر النطق لدى الطفل إذا لم تظهر لديه مراحل التطور مثل باقي أقرانه، ويمكن أن يواجه الطفل صعوبة في فهم الآخرين والتعبير عن أنفسهم، وقد يترافق تأخر النطق لدى الطفل بضعف السمع والإدراك. اسباب تأخر النطق الحرمان البيئي والإهمال. ولادة الطفل مبكراً. أن يكون الطفل ذكر. التهاب الأذن المزمن. للمزيد: أعراض صعوبات التعلم عند الأطفال وكيف يمكنك المساعدة كيف يتم تشخيص تأخر النطق؟ يعتمد تشخيص تأخر النطق عند الطفل على توافر أحد المعايير التالية: عدم ملاحظة ثروة الطفل بمقطعين ببلوغه عام واحد. تكلم الطفل بأقل من 6 كلمات أو فرط الترويل ببلوغه 18 شهراً. عدم النطق بجمل تتكون من 2 - 3 كلمات ببلوغه عامين ونصف. النطق بجمل غير مفهومة عند بلوغه سن الرابعة. علاج تأخر النطق قد يشمل علاج تأخر النطق عدد من التدابير التي تعتمد على العامل المُسبب لتأخر النطق كضعف السمع، أو اختلال جهاز السمع الذي يتطلب التدخل الجراحي، إضافة الى التحاق الطفل ببرنامج تأهيلي بإشراف مُعالجين مختصين في النطق. يمكن أن يساعد علاج الحالات الأخرى على علاج مشكلة التأخر في النطق،