

Optalgin هو دواء يحتوي على العنصر النشط Metamizole Sodium (المعروف أيضًا باسم Dipyron). لا يتوفر الميتاميزول بشكل شائع بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة فيما يتعلق بالآثار الجانبية النادرة ولكن الخطيرة مثل ندرة المحببات (انخفاض حاد في عدد خلايا الدم البيضاء). في بعض البلدان حيث لا يزال متاحًا، يمكن دمج Optalgin مع مكونات نشطة أخرى اعتمادًا على التركيبة والاستخدام المقصود. قد تتضمن المجموعات الشائعة ما يلي: ميتاميزول الصوديوم (ديبيرون) مع بيتوفينون هيدروكلوريد: غالبًا ما يستخدم هذا المزيج كمسكن للألم ومضاد للتشنج لحالات مثل تقلصات وتشنجات البطن. ميتاميزول الصوديوم (ديبيرون) مع بروميد الفينيفيرينيوم: يستخدم هذا المزيج لتخفيف الألم والتشنجات في حالات مثل اضطرابات الجهاز الهضمي أو المسالك البولية. ميتاميزول الصوديوم (ديبيرون) مع بروميد الفينيفيرينيوم وهيدروكلوريد البيتوفينون: يوفر هذا المزيج راحة شاملة من الألم والتشنجات والانزعاج المرتبط بها. قد تختلف تركيبة وتركيبات Optalgin المحددة اعتمادًا على الشركة المصنعة واللوائح الإقليمية. كما هو الحال دائمًا، من الضروري استخدام الأدوية فقط تحت إشراف أخصائي الرعاية الصحية وأن تكون على دراية بأي آثار جانبية أو موانع محتملة.