النشرة الطبية لدواء دوليبران (Doliprane)● المادة الفعالة: باراسيتامول (Paracetamol) بنسبة 500 مجم أو 1000 مجم لكل قرص.1. دواعي الاستعماليُستخدم هذا الدواء لعلاج الأعراض التالية: وآلام الدورة الشهرية).2. الجرعات وطريقة الاستخدام (للبالغين والأطفال فوق 50 كجم)● الجرعة المعتادة: قرص واحد (تركيز 500 مجم أو 1000 مجم حسب الحاجة) يُعاد كل 4 إلى 6 ساعات.● الحد الأدنى بين الجرعات: يجب ترك فاصل زمني لا يقل عن 4 ساعات بين كل جرعة وأخرى.● الجرعة اليومية القصوى: ● 3 غرامات يومياً (ما يعادل 3 أقراص من عيار 1000 مجم أو 6 أقراص من عيار 500 مجم). ● يمكن رفعها إلى 4 غرامات كحد أقصى في حالات الألم الشديد وفقط بناءً على استشارة طبية. ويمكن تناولها مع الطعام أو بدونه.3. موانع الاستعمال والتحذيراتلا تتناول هذا الدواء في الحالات التالية:● وجود حساسية مفرطة لمادة الباراسيتامول أو لأي من مكونات الدواء.● الإصابة بأمراض أو قصور شديد في وظائف الكبد.تحذيرات هامة لمنع التسمم الدوائي:● خطر الجرعة الزائدة: لا تتناول أي أدوية أخرى تحتوي على الباراسيتامول بالتزامن مع دوليبران لتفادي إلحاق ضرر جسيم وخاف بال كبد. أو 5 أيام لعلاج الألم دون مراجعة الطبيب.4. الحمل والرضاعة ولكن يُفضل استخدام أقل جرعة فعالة ولأقصر مدة ممكنة بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي.5. شروط الحفظ والتخزين

lakhasly.com © تم تلخيص النص بواسطة موقع لخصلي