

رهدفت الدراسة الحالية الى الكشف عن العلاقة بين مستوى الفعالية الذاتية واضطراب التكتّم لدى النساء المصابات بسرطان الثدي، بالاعتماد على المزاوجة بين المنهج الوصفي (الدراسة الاستطلاعية) و المنهج العيادي القائم على دراسة الحالة (الدراسة الأساسية) ، حيث تكونت عينة الدراسة من 10 نساء مصابات بسرطان الثدي في الدراسة الاستطلاعية واختيار 04 حالات منها في الدراسة الاساسية، من خلال تطبيق مقياس الفعالية الذاتية 10-GES لـ J. Schwarzer (1986) و jenrusalem & مقاييس تورينتو للالكسيثيميا . bageby & parker (1994) TAS-20 تمثلت اهم النتائج كما يلي: 1. لا توجد فروق في مستوى الفعالية الذاتية لدى النساء المصابات بسرطان الثدي تعزى إلى الحالة الاجتماعية (عازبة، 2. لا توجد فروق في مستوى الفعالية الذاتية لدى النساء المصابات بسرطان الثدي تعزى إلى المستوى التعليمي (متوسط، 3. لا توجد فروق في مستوى الفعالية الذاتية لدى النساء المصابات بسرطان الثدي تعزى إلى السن. 4. توجد علاقة ارتباطية بين مستوى الفعالية الذاتية و مستوى التكتّم لدى النساء المصابات بسرطان الثدي. 5. لا توجد فروق في مستوى التكتّم لدى النساء المصابات بسرطان الثدي تعزى إلى الحالة الاجتماعية (عازبة، أرملة) لصالح العاملات. 6. توجد فروق في مستوى التكتّم لدى النساء المصابات بسرطان الثدي تعزى إلى المستوى التعليمي (متوسط، 7. توجد فروق في مستوى التكتّم لدى النساء المصابات بسرطان الثدي تعزى إلى السن. الكلمات المفتاحية: الفعالية الذاتية، اضطراب التكتّم "الالكسيثيميا"،