

هيدروكلوريد 150 ملغ أسأل طبيبك أو الصيدلي. قد يضرهم ، حتى لو كانت Trazodone حزمة النشرة: معلومات للمريض هيدروكلوريد Trazodone علامات المرض لديهم هي نفسها التي تظهر عليهم. - إذا كنت تعاني من أي آثار جانبية ، 1. ما هو وما هو استخدامه ل 4. الآثار الجانبية المحتملة 6. محتوى الحزمة وغيرها من المعلومات 1. ما هو ترازودون وما يستخدم من أجله ينتمي ترازودون هيدروكلوريد إلى مجموعة من الأدوية المعروفة باسم مضادات الاكتئاب. يتم استخدامه لتجعلك تشعر بأنك في علاج اكتئابك ، إذا اتبعت العلاج فسوف: - ساعد على استعادة Trazodone Hydrochloride أقل اكتئاب وأقل قلقاً. يساعد اهتمامك بالأنشطة اليومية. 2. ما تحتاج إلى معرفته قبل أن تأخذ ترازودون هيدروكلوريد لا تأخذ ترازودون هيدروكلوريد: - إذا كنت تعاني من حساسية من ترازودون أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء (المذكورة في القسم 6). - إذا كنت شارباً قوياً أو تتناول أقراصاً للنوم - إذا كنت تعاني من نوبة قلبية المحاذير والإحتياطات أفكار الانتحار وتفاقم الاكتئاب أو اضطراب القلق إذا كنت تعاني من الاكتئاب و / أو تعاني من اضطرابات القلق ، فيمكنك أحياناً التفكير في إيذاء نفسك أو قتلك. قد تزداد هذه الأعراض عند بدء مضادات الاكتئاب لأول مرة ، وعادة ما تستغرق حوالي أسبوعين ولكن في بعض الأحيان أطول. قد تكون أكثر عرضة للتفكير بهذا الشكل: - إذا كنت شاب بالغ. أظهرت المعلومات المستقاة من التجارب السريرية زيادة خطر السلوك الانتحاري لدى البالغين الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً والذين يعانون من أمراض نفسية والذين عولجوا بمضادات الاكتئاب. إذا كانت لديك أفكار عن إيذاء نفسك أو قتلك في أي وقت ، فاتصل بطبيبك أو اذهب إلى المستشفى على الفور. أو إذا كانوا قلقين بشأن التغييرات في سلوكك. يجب أن تخبر طبيبك قبل تناول الدواء: - إذا كان لديك أو كان لديك نوبات أو نوبات - إذا كنت تعاني من أمراض القلب - إذا كان لديك مرض في الكلى أو الكبد - إذا كنت تعاني من انخفاض ضغط الدم - إذا كان لديك زرق ضيق الزاوية (اضطراب في العين) - إذا كنت مسناً ، - إذا كان لديك غدة درقية مفرطة النشاط (فرط نشاط الغدة الدرقية) - إذا Trazodone كنت تعاني من مرض انفصام الشخصية أو أي نوع آخر من الاضطرابات النفسية أثناء علاجك باستخدام إذا كنت تعاني من فقدان الشهية وضعف غير عادي وآلام في المعدة وغثيان وقيء وأصفرار الجلد و / أو ، Hydrochloride العينين ؛ قد تكون هذه علامات على مرض الكبد الذي يهدد الحياة. اتصل بطبيبك على الفور ، وعليه إجراء بعض اختبارات وظائف الكبد وقد يقرر إيقاف علاجك بهذا الدواء. خاصةً عند الاستيقاظ من وضعية الجلوس أو الكذب (انخفاض ضغط الدم الانتصابي) ، الأطفال والمراهقين لا ينبغي إعطاء هذا الدواء للأطفال والمراهقين دون سن 18 عاماً. أدوية أخرى وترازودون أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول ، أو تناولتها في الأسبوعين الأخيرين - أدوية أخرى للاكتئاب (مثل أميتريبتيلين أو فلوكستين) - الأدوية المستخدمة لإنتاج الهدوء أو لمساعدتك على النوم (مثل المهدئات أو حبوب النوم) - الأدوية المضادة للهستامين - وسائل منع الحمل عن طريق الفم - أدوية لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ، الديجوكسين والجوانيثيدين إيتراكونازول وكيوتوكونازول (يستخدم لعلاج الالتهابات الفطرية) - السيميبتيدين (يستخدم لعلاج القرحة) - الإريثروميسين (مضاد حيوي يستخدم لعلاج الالتهابات) - ليفودوبا (يستخدم لعلاج مرض باركنسون) - كلوربرومازين ، ليفومبرومازين ، بيرفينازين (كلها تستخدم لمنع تأثير المواد الكيميائية في الدماغ) - نبتة سانت جون (علاج عشبي) - الوارفارين (يستخدم لمنع دمك من التخثر) عقاقير مخدرة أخبر طبيبك أو طبيب الأسنان أنك تتناول ترازودون. مشاكل قلبية يجب توخي الحذر عند استخدام هذا النوع من الدواء ، التسجيل الكهربائي للقلب). يجب تجنب شرب الكحول أثناء تناول الترازودون. الحمل والرضاعة الطبيعية إذا كنت حاملاً أو مرضعة ، فأعتقد أنك قد تكون حاملاً أو تخطط لإنجاب طفل ، قد يؤدي تناول ترازودون في المراحل المتأخرة من الحمل إلى تشعر بالنعاس والدوار أو قد تتأثر برؤية واضحة. إذا حدث Trazodone تعرض طفلك لأعراض انسحاب عند ولادته. قد تجعلك هذا ، هيدروكلوريد ترازودون يحتوي على اللاكتوز إذا أخبر طبيبك أنك لا تتحمل بعض السكريات ، فاتصل بطبيبك قبل تناول هذا الدواء. استشر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت غير متأكد. الكبار: • قد يزيد طبيبك الجرعة إلى 300 ملغ كل يوم حسب حالتك. للبالغين في المستشفى قد تصل الجرعة إلى 600 ملغ كل يوم. • الجرعة الموصى بها هي 75 ملغ كل يوم العجزة: استخدام في الأطفال والمراهقين لا ينبغي إعطاء أقراص ترازودون هيدروكلوريد للأطفال دون سن 18 عاماً. طريقة الإدارة عند تناول ترازودون هيدروكلوريد: • ابتلاع الأقراص بالماء • خذ دائماً مع أو بعد الوجبة الغذائية. هذا يمكن أن يقلل من فرصة الآثار الجانبية فعليك تناولها قبل الذهاب إلى السرير فلا تقم بتغيير الجرعة بنفسك ، إذا كنت تتناول الكثير من الأقراص عن طريق الخطأ ، الدوار أو الإغماء ، النوبات (النوبات) ، مشاكل التنفس ، انخفاض ضغط الدم أو مشاكل في القلب. إذا نسيت تناول عقار ترازودون فلا تأخذ الجرعة الفائتة على الإطلاق ولا تضاعف الجرعة ، Trazodone Hydrochloride هيدروكلوريد إذا نسيت تناول أقراص

التالية ، فقط استمر كما كان من قبل. لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض قرص منسي. إذا توقفت عن تناول هيدروكلوريد ترازودون عندما يخبرك طبيبك بالتوقف عن تناول هذه الأقراص ، سيساعدك على التوقف عن تناولها تدريجياً لتقليل خطر الغثيان والصداع والشعور بالضيق. اسأل طبيبك أو الصيدلي. 4. الآثار الجانبية المحتملة مثل جميع الأدوية ، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثاراً جانبية ، أو التعرق ، أو الارتعاش ، ● الشعور بالإعياء الشديد ربما بسبب ضيق التنفس ، وارتعاش ، وارتفاع في درجة الحرارة (أعلى من 38 درجة مئوية). قد تكون هذه حالة نادرة تعرف باسم متلازمة الخبيثة العصبية والشعور بالمرض ، والمرض ، وفقدان الشهية ، وآلام في المعدة ؛ قد يكون هذا بسبب اضطراب الدم (انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء التي تكافح العدوى) ● كدمات بسهولة أكثر من المعتاد. تحدث إلى طبيبك على الفور إذا لاحظت الآثار الجانبية التالية: والدوار ، وخز ، وحرق أو زحف على الجلد ● قد يتسبب هذا الدواء في دقات القلب غير المنتظمة لدى مرضى القلب ، ● فقدان الوزن ، وفقدان الشهية ، ● عدم وضوح الرؤية ألم في عضلاتك ، خاصة في الذراعين والساقين ، اضطراب في الذاكرة ● انخفاض الدافع الجنسي والحكة ● ضغط دم مرتفع ● ارتفاع درجة الحرارة ، ونوع الانفلونزا الأعراض ● صعوبة في التحدث ● مستويات عالية من إنزيمات الكبد في دمك فتحدث إلى طبيبك أو الصيدلي ، وهذا يشمل أي آثار جانبية محتملة غير مدرجة في هذه النشرة. يمكنك أيضاً الإبلاغ عن الآثار عن طريق الإبلاغ عن الآثار الجانبية ، الحفاظ. www.gov.uk/yellowcard: الجانبية مباشرة عبر مخطط البطاقة الصفراء على على هذا الدواء بعيداً عن مرأى ومدى وصول الأطفال. لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور في الملصق أو محتويات الحزمة وغيرها من المعلومات 6. "EXP" الكرتون بعد