

يعتبر سوء التغذية الحاد الشديد أخطر أشكال سوء التغذية في مرحلة الطفولة، باعتباره مشكلة صحية عامة رئيسية مرتبطة هو أحد SAM. بمعدلات عالية جداً من الاعتلال والوفيات. وهو أحد المحركات الرئيسية لوفيات الأطفال في البلدان النامية بين SAM. الأسباب الرئيسية لدخول الأطفال إلى المستشفيات وهو أحد الدوافع الرئيسية لوفيات الأطفال في البلدان النامية الأطفال له نتائج سلبية له عواقب فسيولوجية خطيرة، والعدوى المتزامنة مثل الإسهال والالتهاب الرئوي. بالإضافة إلى ذلك، الكلمات الرئيسية: سوء التغذية الحاد الشديد؛ يعد سوء التغذية الحاد الشديد أخطر أشكال سوء التغذية في مرحلة الطفولة، باعتباره مشكلة صحية عامة رئيسية ترتبط بارتفاع معدلات الاعتلال والوفيات وتهدد حياة ملايين الأطفال سنوياً في جميع أنحاء هو أحد الأسباب الرئيسية لدخول الأطفال إلى المستشفى [4]. وهو أحد الدوافع الرئيسية لوفيات الأطفال في SAM. العالم [1-3] يعتبر سبباً رئيسياً SAM البلدان النامية [5]. وفقاً لتقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في عام 2015، أشار إلى أن أكثر عرضة للوفاة بتسعة أضعاف من SAM للوفاة لدى الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات [6]. الأطفال المصابون به عندما لا يكون الطفل على ما يكفي من الطاقة أو البروتين والعناصر الغذائية SAM الأطفال الذين يتغذون جيداً [7-9]. يتطور عن انخفاض مفاجئ في تناول الطعام أو جودة النظام الغذائي SAM الأخرى من الطعام لتلبية احتياجاته الغذائية [10]. ينتج لدى الأطفال الذين SAM وغالباً ما يتم دمجها مع أسباب مرضية ويرتبط بفقدان دهون الجسم وإهدار العضلات الهيكلية، تعريف درجة من معيار النمو لمنظمة الصحة العالمية-Z تتراوح أعمارهم بين 6 و 59 شهراً والمعروف على أنه وزن للطول/الطول-3 [16] على الصعيد العالمي، يعيش 70-80٪ من أطفال العالم الذين يعانون من سوء التغذية في البلدان النامية. اليمن لديها ثالث أعلى معدلات نقص التغذية في العالم بعد الهند وبنغلاديش؛ وسيزداد العدد الإجمالي للحالات الحالية بعدد الحالات الجديدة وسينخفض بعدد الأطفال الذين يتعافون أو يموتون [6]. وفقاً لآخر تقديرات اليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي في جميع أنحاء العالم. 3 مليون من هذه البلدان المتأثرة CU5 المشتركة لسوء التغذية الحاد لعام 2020، فإن 47 مليون بالبنغالينات، يعيش حوالي 75٪ من جميع الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد في البلدان ذات الدخل المتوسط لا يزال نقص التغذية من بين الرائدتين في آسيا وأوقيانوسيا، يرتبط سوء التغذية [21] SAM المنخفض. يعاني 2٪ من الأطفال من الحاد بسوء التغذية الحاد. 4% وفيات الأطفال في غياب العلاج الفعال [24]، ويرتبط كل عام ما يقرب من 2, 3 مليون حالة وفاة بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-59 أشهر في البلدان النامية بسوء التغذية الحاد [25]. أظهرت دراسة أجريت لمقارنة المؤشرات في تحليل جماعي متعدد البلدان في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال ونيبال، أن الأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الذين يعانون من خطر أكبر بمقدار 8 أضعاف الموت مقارنة بالأطفال غير المصابين بسوء التغذية [27]. [1] أشارت إلى أن درجة سوء التغذية الحاد مرتبطة بشكل إيجابي بزيادة خطر الوفاة. 6 مرات من الأطفال الذين يتغذون له عواقب فسيولوجية خطيرة مما يؤدي إلى زيادة حمولة النص الكامل SAM: جيداً [8]، زيادة الاعتلال مشيراً إلى أن العلاقة بين سوء التغذية الحاد والعدوى غالباً ما توصف بأنها full-tex al. اقرأ PDFenergyaframmuriente حلقة مفرغة مدارية تتجه إلى البداية والتقدم في التغذية. وجود آليات للاختلال الوظيفي المناعي لدى الأفراد المصابين بسوء فإن SAM، التغذية. غالباً ما تتضرر سلامة الحاجز المخاطي للجلد والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي لدى الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالتقرح. الحد من الأداء المدرسي والقدرة على العمل: يقل احتمال أن يحقق الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في المستقبل إمكاناتهم الكاملة من حيث التعليم والإنتاجية الاقتصادية، تشير منظمة الصحة العالمية (2009) إلى أن هناك أدلة على ذلك ويعاني البالغون الذين يعانون من سوء التغذية في مرحلة الطفولة المبكرة من ضعف في الأداء الفكري وانخفاض القدرة على العمل البدني. زيادة خطر انخفاض الوزن عند الولادة: يرتبط انخفاض الوزن عند الولادة ارتباطاً أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه إذا كانت النساء يعانين من سوء التغذية في طفولتها، وقد يكون وزن SAM كبيراً به إلى زيادة خطر الإصابة SAM أطفالهن أقل عند الولادة، ولديهن ولادات أكثر تعقيداً. زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة: يؤدي بأمراض مزمنة في مرحلة البلوغ مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية والسكري والسمنة [3835]