

إلى مجموعة من الأدوية تسمى البنزوديازيبينات التي Lexotan يحتوي على العنصر النشط برومازيپام. ينتمي Lexotan 2017 للقلق والتوتر أو التحريض. بشكل عام ، Lexotan يعتقد أنها تعمل من خلال عملها على المواد الكيميائية في الدماغ. يستخدم لفترات زمنية قصيرة فقط (على سبيل المثال 2 إلى 4 أسابيع). لا ينصح Lexotan يجب أن تؤخذ البنزوديازيبينات مثل بالاستخدام المستمر على المدى الطويل إلا إذا نصح طبيبك. هذا الدواء قد يكون الادمان. لا يتوفر هذا الدواء إلا بوصفة الطبيب أقراص. (iii) (172) CI 77492 ، (تظهر خصائص مهدئ ومريح للاسترخاء. العنصر النشط هو برومازيپام. التلك (553) البنزوديازيبينات الأخرى أو أي Lexotan قبل أن تأخذ Lexotan خالية من الجلوتين. نصيحة الجرعة: كيفية استخدام Lexotan مكونات مدرجة هنا. طفق جلدي أو حكة أو خلايا على الجلد ؛ كنت تعاني من توقف التنفس أثناء النوم (توقف مؤقت في التنفس عند النوم) ؛ لديك مرض ضعف العضلات المعروف باسم الوهن العضلي الوبيل. الحزمة ممزقة أو تظهر علامات العبث ؛ فقد لا يعمل بشكل جيد. إذا لم تكن متأكدًا مما إذا كنت يجب أن تأخذ عقار ليكسوتان ، قبل البدء في تناولها: يجب أن تعرف طبيبك عن للاستخدام في النساء الحوامل. ستناقش Lexotan أخبر أنك الطبيب إذا: لا ينصح Lexotan. كل ما يلي قبل البدء في تناول إذا كنت حاملاً أو تخطط للحمل ؛ أنت ترضعين طفلك أو ترضعين طفلك. لديك أي Lexotan طبيبك مخاطر وفوائد استخدام مشاكل صحية أخرى ، خاصة ما يلي: أمراض الكبد أو الكلى أو الرئة. ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم. لديك ارتفاع الضغط في إذا لم تخبر طبيبك عن أي مما ذكر أعلاه ، تناول Lexotan. العين (الجلوكوما) ؛ تشرب الكحول بانتظام. الكحول قد يزيد من آثار تشمل هذه الأدوية: أقراص Lexotan. الأدوية الأخرى أخبر طبيبك إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى ، قد تتداخل بعض الأدوية مع النوم الأخرى أو المهدئات أو المهدئات ؛ أدوية أخرى للقلق. الأدوية للسيطرة على نوبات (الصرع) ؛ بعض الأدوية المستخدمة لعلاج الحساسية ونزلات البرد. مسكنات الألم مرخيات العضلات عقاقير مخدرة؛ بعض الأدوية المستخدمة لعلاج الالتهابات البكتيرية. بعض الأدوية المستخدمة لعلاج أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم. السيميتيدين – دواء يستخدم لعلاج القرحة. قد تتأثر هذه الأدوية بكزوتان ، أو قد تؤثر على مدى فعالية ليكزوتان.