.BR وتلك الناتجة عن إزاحة الدهون والمنظفات التي أحاطت في الأصل بالجزء الكاره للماء GroEL–BR مقال بحثي من ربط إلى محلول سائب سترتبط مرة أخرى بالكسور الأخرى GroEL–BR من المتصور أن الدهون والمنظفات المشردة من واجهات ل BR الكاره للماء، من وجهة النظر هذه، ومع ذلك، من أجل وكلاهما مسعور. هنا، أظهرنا أن تقارب electect من خلال على الرغم من أن المطابق الأصلي نفسه يظهر أيضا تقاربا كبيرا. abour enold que o sus cenauradon يتم تعزيزه GroEL ؛ بالمقارنة2000 .Farr et al) للعديد من البروتينات القابلة للذوبان غير الأصلية GroEL وقد ظهر الربط متعدد التكافؤ بواسطة بالارتباط بجزيء البروتين GroEL مما يسمح من المفترض أن ،(Krishnamani et al. 2012) الأصلي الذي يضم هيكل BR مع بأكمله من المتصور أن الضغوط التطورية، 2015، 2016) التي سيشرك فيها الهيكل الطويل مواقع ربط أكثر من الحالة المطوية ،Grobl واحد فقط، سواء تم تشويهه أم لا، يرتبط ب BR مكدس إثبات أن GroEL وبالتالي تتمتع بميزة تنافسية في الارتباط ب عام 2005). 2006). على غرار التعاونية بين الحلقات .Sun et al) وبالمثل، تحليل من السلبية بعد غسيل الكلى للمنظفات الذائبة على الرغم من أن الآلية الأساسية على المستوى الجزيئي لا ،(Gruber and Horovitz 2016) AIP السلبية المعروفة الناجمة عن .DDM تأثيرين معاكسين: خفض المعدل ولكن زيادة انتعاش البروتين المطوي في وجود apoGroEL يزال يتعين تحديدها يظهر غير الأصلي مع BR على سبيل المثال، تفاعل

Summarized by © lakhasly.com