

Une appendicite se manifeste par des symptômes tels que des douleurs abdominales, de la fièvre ou des troubles digestifs. L'examen clinique retrouve souvent des signes typiques d'atteinte du péritoine (abdomen très douloureux et dur à la palpation). Si l'appendice n'est pas à sa position normale (appendice ectopique), les douleurs ne sont pas dans la fosse iliaque droite, mais, elles sont, selon l'emplacement de l'appendice, plus hautes, plus à gauche ou plus basses dans la région pelvienne. Les examens en vue du diagnostic d'appendicite La bandelette urinaire et l'analyse des urines Lors de la consultation, le médecin traitant doit éliminer une cystite, qui pourrait être responsable de douleurs abdominales. Si le diagnostic de l'appendicite est posé sur un ensemble d'éléments évocateurs, une hospitalisation est nécessaire en vue d'une intervention chirurgicale (appendicectomie). En cas de doute, le médecin peut proposer une surveillance à domicile ou une hospitalisation pour suivre l'évolution des symptômes, préciser le diagnostic et éviter une intervention inutile. Les symptômes de l'appendicite aiguë

Appendicite : une douleur abdominale pratiquement toujours présente La douleur de l'appendicite débute d'emblée dans la fosse iliaque droite (en bas à droite du nombril) ou est d'abord ressentie autour de l'ombilic. En effet, d'autres maladies peuvent causer des douleurs au niveau de la fosse iliaque droite et des tableaux similaires :

Appendicite : un diagnostic parfois difficile L'appendicite peut être atypique et prendre d'autres formes selon les personnes atteintes et selon la localisation de l'appendice.

Appendicite du petit enfant Chez l'enfant de moins de trois ans, insomnie, agitation, diarrhée, perte d'appétit et fièvre élevée sont parfois au premier plan. Pour cela, il réalise le test de la bandelette urinaire qui recherche la présence de leucocytes (globules blancs) et de nitrites produits lors d'une infection urinaire. Celle-ci peut être renouvelée quelques heures après si la première est normale ou si elle ne permet pas de poser le diagnostic ;

une gastro-entérite virale de l'enfant ou chez l'adulte ;

2.3.4.5.