

فى الماضى القريب كان المفهوم الدارج عن الشقوق الطليقة هو وجود ذرة أو (Types Of Free Radicals & Their sources) ذرة فى جزئ لها واحد أو أكثر من الإلكترونات غير المزدوجة ، عدم التزاوج هذا يجعلها شرهه للتفاعل مع المواد الأخرى لأكمال عملية المزاوجة ، وفى أثناء تلك العملية يحدث التلف ولكن بعد تقدم التقنيات الحديثة والأبحاث العلمية الدقيقة لإيجاد تفصيلات أكثر دقة عن هذه المرحلة أو تلك العملية ، تمكن العلماء فى مجال الكيمياء الحيوية من تقسيم تلك العملية إلى مراحل ينتج عنها أنواع مختلفة من الشقوق الطليقة (٥٣) (٣٧). فللشقوق الطليقة أربعة أنواع رئيسية كما هو موضح بالشكل التالى :-

أثناء عملية التنفس فإن (Reactive oxygen species or oxygen-derived free radicals) الشقوق الطليقة الأكسجينية الأكسجين يتم اختزاله تدريجيا إلى الماء وذلك بعملية بعد الاختزال بالإلكترون الأول أو الثانى أو فقد تكون شقوق طليقة هى على والذى يحفز إنتاجه بواسطة الأوزون وهو أكثرهم إحداثا ($O_2^{\bullet-}$ anion, (Superoxide)) - سوبر أكسيد أنيون ٢ وتحفز هذه H_2O_2 لطفرات فى الحامض النووى ، وكذلك ينتج بفعل الأشعة فوق البنفسجية المتفاعلة مع بروكسيد الهيدروجين (Hydrogen peroxide, (Fenton reaction)) $+2$ وهو ما يعرف بتفاعل فنتن (٨٥) Fe^{+3} التفاعلات بوجود الحديد الحر ١٢ ر ١٢يدروكسيل شق - ج كل هذه الشقوق غاية فى الخطورة (Hydroxyl free radical, (٢) ١٢يدروجين ١٢يدروجين - بروكسيد - H_2O_2 خاصة الأخير ولكنها جميعا ذات عمر قصير جدا ، رغم أنها قادرة على أكسدة الجزيئات الرئيسية فى الجسم مثل الأحماض وهو مؤكسد قوى للدهون وينتج بسبب إعادة ترتيب (Singlet) Oxygen, (٥٢) النووية والبروتين والدهون - الأكسجين ١ الذرى ١ الإلكترونات فى جزئ الأكسجين والذى يحفز بالأشعة فوق البنفسجية والأدوية التى تزيد الحساسية للضوء والمحفزات الداخلية (٥٣) .- تسبب الشراة التفاعلية للشقوق الطليقة الأكسجينية ، محدودة فى دائرة تأثيرهم (Heme) مثل صبغة الدم الحمراء الضار فى الخلية التى هى عرضة لهذا التأثير الضار، خاصة الدهون فى الغشاء الخلوى والبروتينات التركيبية والأنزيمات والأحماض النووية ، وعيوب الأخير (الأحماض النووية) أنها تؤدي إلى طفرات ينتج عنها موت الخلايا أو أمراض المناعة الذاتية أو السرطان .والشقوق الطليقة للأكسجين تتسرب بصفة منتظمة من نظم أنزيمية عديدة مثل السلسلة التنفسية وأنزيم السيوكروم فى الشبكة الأندوبلازمية وأنزيمات الأكسدة مثل (Cytochrome (٥٠) بالميوكندريا Mitochondrial respiratory chain ١٢ي ويوضح الشكل التالى (Xanthine Oxidase) (الأحادية الأمينات أكسدة وأنزيمات (Monoamine Oxidase) أكسدة الأكرانسين جميع هذه الشقوق وخطوات تكوينها وبعض طرق التخلص الآمن منها داخل الجسم ومن خلال ما هو مخزن ومنتج داخليا (٥٣) (٧٩) (٦٣) (٦٤) شكل ١) (فمن هذا الشكل يتضح التسلسل الطبيعى لتحويل جزئ الأكسجين إلى الشقوق الأكسجينية المختلفة) وبعض (H_2O) ٢ إلى الصورة المائية الآمنة H_2O_2 وبيروكسيد الهيدروجين O .- ٢ - سوبر أكسيد أنيون الأكسجين الذرى ١ and (المضادات الطبيعية للأكسدة وكيفية مقاومة الشقوق الطليقة مثل السوبر أكسيد ديسميثاز و الكاتاليز و البيروكسيداز ٥٢ بمعنى أن الأكسجين المتسرب خارج السلسلة التنفسية والذى يقدر بحوالى ٤٠% لا بد (Catalase SOD, peroxidase) أن يتحول إلى ماء كالأذى لم يحدث له التسرب من داخل السلسلة التنفسية ، فيحتاج هذا الأكسجين الى ان يختزل بواسطة إضافة ٢ الذى يعد وجوده محفزا لعمل H_2O إلكترون إلى هذا الجزء الذى يتحول فى ثم يختزل أيضا ليتحول الى بروكسيد الهيدروجين بعد ذلك وفى وجود الحديد الحر يتحول الى الهيدروكسيل الحر . H_2O والذى يعتبر SOD الأنزيمات المضادة للأكسدة مثل وبإضافة OH ٢ أحد أخطر الشقوق الطليقة المتكونة فى هذه المرحلة الذى يختزل أيضا ليتحول إلى أيون الهيدروكسيل الأمن وتشمل على أكسيد النيتريك (Oxides Nitrogen (٢) الشقوق النيتروجينية الطليقة - H_2O الهيدروجين يتحول الأخير إلى الماء (و بروكسيد النيتروجين الهيدروجين nitrogen dioxide وثانى أكسيد النيتروجين (Nitric oxide, $NO^{\bullet}$) (ONOOH (الهيدروجين hydroperoxide (NOOH)) النيتريت بروكسيد و . (Peroxynitrite, ONOO $^{\bullet}$) وشكله Nitrogen كمنفذ ثانوى لفعل عدد ($NO^{\bullet}$) وهى جميعا شقوق طليقة لوجود إلكترونات غير مزدوجة بها . وفى الحالات الطبيعية يعمل الأول إلى (Arginine من الهرمونات وعوامل التحكم فى انقسام وايض الخلايا ، وهو ينتج من تحول الحمض الأميني الأرجينين كبيرة جدا ، فهو يتفاعل . Synthase, ($NO^{\bullet}$) بواسطة أنزيم تخليق أكسيد النيتريك (Citrulline) (الحمض الأميني السيتريولين ٢) الذى ينتج كذلك من الاحتراق الغير كامل للوقود والمواد كما يوجد بكميات NO (مع الأكسجين لينتج ثانى أكسيد النيتروجين كبيرة بدخان السجائر ويتفاعل مع الدهون فى غشاء الخلية ، وكذلك فإنه يتفاعل مع سوبر أكسيد أنيون معطيا بروكسيد النيتريت الطليقة الدهنية الشقوق - ٣ تتميز الدهون بأنها أعلى المستويات اختزالا id-derived free radicals وهو الأكثر خطورة والذى من بين عناصر الجسم ، وبالتالي فهى عرضة أكثر من غيرها للتأكسد بشقوق الأكسجين والنيتروجين خاصة الدهون الغير مشبعة

بالجدر الخلوية وتحت الخلوية ، والميزة الأكثر خطورة للدهون هي تحولها في ذاتها بعد ذلك لشقوق طليقة وهو ما يسمى بالأكسدة (LOO● وبيروكسيد الدهون الحر) (●L الفوقية للدهون كما هو موضح بالشكل) ٢ (، وتشمل هذه الشقوق شق الدهون الحر) والأخير يتفاعل مع الأكسجين في وجود الحديد ليعطى شق الإيبوكسي الليليك . LOOH (وبيروكسيد الدهون الهيدروجيني الذى يؤكسد الشقوق سالفة الذكر ، ولكن ذلك يعطيها عمر أطول كثيرا) ، Peroxide Allylic Epoxy OLOO● (بيروكسيد مسببا ضررا أكبر وفى دائرة أوسع من بؤرة حدوث الأكسدة خاصة للأحماض النووية منتجا طفرات . (٧٩)(٣٧)(٦٣) ويوضح الشكل التالى خطوات الأكسدة الفوقية للدهون وكيفية التخلص منها بمضادات الأكسدة المختلفة فى غشاء وسيتوبلازم الخلية .) فى وقف تفاعل السلسلة الجهنمية لأكسدة الدهون داخل الخلية ويحولها إلى السيتوبلازم E ٣ (شكل) ٢ (حيث يستخدم فيتامين مرة أخرى لصورته الأولية النشطة ٢٤) (بمعنى ان العمليات E كشقوق دهنية غير ضارة ومن السيتوبلازم يعاد تجديد فيتامين التى تتم فى غشاء الخلية لها هدفان اساسيين ، الأول هو وقف التسلسل الجهنمي لشق البيروكسيد الدهنى المتكون من المرحلة السابقة ، والهدف الثانى هو تحويل هذا الشق الحر الى هيدروجين بيروكسيد الدهون وهو شكل آمن وتتم هذه العملية عن طريق لوقف هذا التسلسل الذى لا ينقطع ولكنه يتحول فى ذاتة الى شق طليق يتم التخلص منه عن طرق تدخل فيتامين E تدخل فيتامين الوجود فى سيتوبلازم الخلية الذى تتم بها عملية التخلص من الشقوق الطليقة التى تكونت عن طريق تفاعلات الجلوتاثيون C بروكسيدز المؤكسد والمختزل وغيرها من العناصر الموضحة بالشكل ليكون المحصلة النهائية من هذا التفاعل الماء وكحول والدهون الأمنة . (شكل) ٣ (ويوضح الشكل) ٣ (المكونات المختلفة لغشاء الخلية ميبنا الوريقة الخارجية بما فيها من وأهم هذه) (التركيبات المعرضة للأكسدة هي الدهون حيث أنها أكثرها اختزالا رغم أن المكونات الأخرى معرضة للتلف أيضا ٥٤) (٧٧) الطليقة الساموم شقوق - معظم المواد السامة والمطفرات والمسرطنات الكيميائية Xenobiotic-derived free radicals . وبعض الأدوية تدخل جسم الإنسان من البيئة وتنقلب داخله أثناء الأيض المعادل لسميتها إلى شقوق طليقة قد تدخل هذه وسوف نتناول المصادر المسببة فى تكوين تلك الشقوق الطليقة فى الجسم سواء كانت مصادر داخلية أو مصادر خارجية يتعرض لكثير داخلية Endogenous Sources :- منها الشخص الرياضى خلال الممارسة الرياضية وتلك المصادر موجزها فى الشكل التالى . سلسلة السيتوكروم اكسيدز الخاصة بالميتوكوندريا وهى تعطى الشقوق الأكسجينية Mitochondrial● مصادر - ١ الخاصة بالشبكة الإندوبلازمية وتعطى) P٤٥٠ Cytochrome (سلسلة السيتوكروم بى ٤٥٠ ● Cytochrome Oxidases (والذى يعطى بيروكسيد الهيدروجين) ، Peroxisome جميع الشقوق الأكسجينية . جسيمات الأكسدة الفوقية البروكسيسوم) ٢ (. أنزيمات الأكسدة وإضافة الأكسجين وتعطى جميع شقوق الأكسجين والدهون مثل أنزيم أكسدة الزانثين والجلوكوز H٢O٢ Indole (Polyamine Oxidase واحاديات وعديد الأمين الحامض الأميني والمؤكسد الزوجى للتريتوفان) Oxidase Glucose وكذلك أنزيمات الأكسدة التخليقية وتنتج) Dioxxygenase للتريتوفان (Tryptophan Dioxxygenase) أمين والأندول (Amine Lipid HO● ، ●- ، O H٢O٢ ، (جميعها بيروكسيد الهيدروجين وسوبراكسيدانين وشق الهيدروكسيل الحر وبيروكسيدات الدهون Activation Of Cells Of Immune خلايا الجهاز المناعى المنشطة وهى تنتج شقوق الأكسجين و حمض ● Peroxides: تفاعلات ● (System Utilize NADPH) Auto oxidation Reactions, Oxidase) الهيبوكلورس (HOCL النيتريت وبيروكسيد Metals (التفاعلات المحفزة بالعناصر الانتقالية ● (e.g., Fe٢+ , Epinephrine) الأكسدة الذاتية مثل الحديد والأدريينالين Exogenous .) (O٢●-) مثل الحديد والنحاس التى تحفز إنتاج شق الهيدروكسيل الحر و سوبر أكسيد الأنين) (Transitional Sources خارجية مصادر - ٢ ● بخان السجائر وهو يحتوى على الأربعة أنواع من الشقوق الطليقة سالفة الذكر . ● استنشاق Sources المواد ذات الأكسدة والاختزال الرجعى مثل المينادايون ● . Hyperoxia الهواء المحتوى على الأكسجين بتركيز أكبر من الطبيعى Adriamycin and (ومضادات السرطان مثل) Drugs Herbicidal (والمضادات العشبية Menadione صورة من فيتامين ك السموم والأدوية المؤكسدة ● . -Rays And X- ٤) (والميتوميسين الأدريناميسين ● الأشعة المؤينة لكس - جاما) (Mitomycin C ٤) (CCL ورباعى كلوريد الكربون) Paracetamol مثل الجرعات الكبيرة من الباراسيتامول (أدوية للرشح وتخفيض الحرارة Rays (الأشعة فوق البنفسجية للشمس ● . P٤٥٠ Cytochrome وكذلك السموم والأدوية المحفزة لأنزيم السيتوكروم بى) (٤٥٠ الحروق) (الاحتراق) (ونواتج الأكسدة ● Shock Heat ومن مصادرها الصناعية ● ضربات الشمس والصدمات الحرارية) (UV Sulfhydryl (السموم الشرهة لمجموعه السلفهيدريل ● Burning Reactions and Burns الفوقية للمواد الغذائية أثناء الطهى (٤٦)(٤٥) (٣ Ignition Incomplete التى تستهلك ● الاحتراق غير الكامل للوقود والمواد العضوية) (Compounds

الجلوتاثيون تصنيع مثبطات ● وتنقسم مضار الشقوق الطليقة إلى ٤ ثلاث أنواع هي :- ١ Inhibitors Of GSH Synthesis والذى يؤدي إلى طفرات تؤدي إلى موت الخلايا أو تسرطنها أو حدوث أمراض (DNA الضرر الواقع على الحامض النووي المناعة الذاتية .- ٢ الضرر الواقع على الدهون أو الأكسدة الفائقة للدهون وهي أخطر هذه الأضرار حيث ينتج عنها شقوق طليقة ذات شراهة تفاعلية متواضعة تكسبها عمر أطول وانتشار أوسع ، وبالتالي ضرر أعم يشتمل على زيادة سيولة الجدر الخلوية وتطفر الحامض النووي وما يتبعه من موت الخلايا أو أمراض المناعة الذاتية أو السرطان (٧٢)(٧٠)(٥٣) . كما تسبب الشقوق الطليقة بعض الأضرار الأخرى نذكر منها :- ١ حدوث الأكسدة الفائقة للدهون في جدر الخلايا والدم . ٢ تثبيط السلسلة ٣ تثبيط العديد من الأنزيمات مثل الصوديوم والبوتاسيوم على جدر Sodium-potassium-ATPase التنفسية للميتوكوندريا الخلايا ٤ فقد البروتينات لطبيعتها وتكون انتيجينات جديدة. - ٥ طفرات الحامض النووي والتي تؤدي إلى موت الخلايا أو تسرطنها - ٦ التثبيط التأكسدي لمجموعه كبيرة من المورثات مثل جين الأنسولين وجين إنزيم