

الطبقات الحيوية السينومانية-التورونية في ثنية المنشور (الجزائر) وتقع في الثنية الشمالية الصحراوية. وتتميز هذه الفترة في هذا القطاع بترسيب الصخور السوداء التي تملأ المنخفضات بين المنصات. (2012، 2016) أن الحد بين السينوماني والتوروني يقع ضمن تكوين "الحجر الجيري لسيدى محمد بن بوزيان". (2016). وفي أقصى جنوب الجزائر توجد رواسب بحرية تغطي منطقة السينومانيان والتورونيان، (1976). في منطقة تينزهرة الوسطى والشرقية، عبر الجزائر، بشكل عام، في التل، بينما في الأطلس الصحراوي الشرقي تكون بيئات الترسيب أقل عمقا نسبيا وهادئة وغالبا ما تكون محصورة. في منطقة الأوراس، تتطور بيئة خارجية بعيدة من نوع المنصة ومناطق انتقالية للمنصة/الحوض. وتعرف بيئة من نوع المنصة الضحلة في جبال أولاد نايل ويشار وفي الصحراء بسمات مشابهة لتلك الموجودة في تكوين "بهلول" في تونس. لاحظ أنه خلال ندوة بروكسل حول العصر الطباشيري Watinoceras devonense Henderson (عام 1995) تم تعيين قسم بويلو (كولورادو، يتم تعيين هذا الحد أيضًا عند ظهور ammonite، Whiteinella Archaeocretacea: لأنواع المنخربات العوالق (PRZ) والذي يحدث في منطقة الامتداد الجزئي، Rotalipora cushmani Morrow، تتوافق مناطق، يتم تحديد قاعدة هذه المنطقة من خلال التواجد الأخير لـ Pessagno. الأمونيت والمنخربات البلانكتونية المميزة في الجزائر للفترة السينومانية-التورونية وارتباطاتها (الجدول 1) مع الإطار الطبقي بالإضافة إلى هذه البيانات الحفرية نستطيع (1995). (Robaszynski et al. 1995) الحيوي الكلاسيكي المحدد للمجال التيثيان إلى الجنوب، في Es Souabaa (Chaabane، وقممت تتجاوز 13%. يتراوح معدل الكربون العضوي الكلي من 0.36% في قسم موجود وإلى الجنوب في المنصة الصحراوية، تكشف طين سينومانو-تورونيان عن معدلات عالية TOC أقسام الحضنة، معدل إلى حد ما من الكربون العضوي الكلي، (1995). تتعلق هذه البيانات بالعديد من المناطق الجغرافية القديمة في الجزائر، بالإضافة إلى بيانات من لونينغ وآخرين. (2004)، والذي يركز على نموذج ترسب المواد العضوية في شمال أفريقيا خلال العصر السينوماني-التوروني (الشكل 1)،