

دراسة وفيات الأمهات في ولاية نهر النيل لتحديد معدل وفيات الأمهات وأسباب الوفاة. هذه دراسة قائمة على المستشفى والمجتمع تم إجراؤها من يناير إلى ديسمبر 2018 في ولاية نهر النيل. تم الحصول على معلومات عن كل وفاة أمومية باستخدام استبيان تم الإصدار 20. النتائج: كان العدد الإجمالي للولادات الحية SPSS ملؤه وفحصه لتغطية الولاية بشكل كامل، ثم تم تحليله باستخدام 25988، مع 29 حالة وفاة أمومية. كان معدل الوفاة 112/100000 ولادة حية. 27 من المرضى (93%) توفوا في المستشفى، بينما توفي حالتان (7%) في المنزل. كان النزيف التوليدي هو السبب الرئيسي لوفيات الأمهات في سبع حالات (24). تليها اضطرابات ضغط الدم في سبع حالات (24). والإصابة بالعدوى في أربع حالات (17). والأسباب التوليدية غير المباشرة في ثلاث حالات (10). في ثلاث حالات (10). والأسباب غير المصنفة في أربع حالات (13). والإجهاض في حالة واحدة (3). (PE & AFE) والانسداد كانت معظم الحالات متأخرة في المنزل (14 حالة، 4%) لم تكن هناك تأخيرات وخمس (17.2%) تأخروا في الوصول إلى المستشفيات. 5%) نتيجة لأسباب يمكن الوقاية منها. كان معدل وفيات الأمهات في ولاية نهر النيل 112/100000 ولادة حية، كانت وفيات الأمهات ناجمة في الغالب عن النزيف وأمراض ضغط الدم والإصابة بالعدوى. تم تأجيل معظم الوفيات حتى وصولهم إلى وجهتهم النهائية.