

اضطراباً غدياً شائعاً (6-20٪ من النساء في سن الإنجاب) يتميز بخلل التبويض المزمن (PCOS) تُعد متلازمة تكيس المبايض هي سبب رئيسي، وتتفاقم بعوامل وراثية، وفرط الأندروجين، والسمنة. تختلف مقاومة (IR) وفرط الأندروجينات. مقاومة الأنسولين (PubMed، Google Scholar، Elsevier، UpToDate) الأنسولين بين أنماط متلازمة تكيس المبايض الظاهرية المختلفة (أربعة أنماط رئيسية). بحث هذه المراجعة يركز على أسباب مقاومة الأنسولين وعلم وظائف الأعضاء المرضية لها في الأنسجة المختلفة (PCOS، Elsevier، UpToDate) الأنسولين بين أنماط متلازمة تكيس المبايض الظاهرية المختلفة (أربعة أنماط رئيسية). بحث هذه المراجعة لدى المصابات بمتلازمة تكيس المبايض. كما تستعرض المراجعة فعالية علاجات زيادة حساسية الأنسولين في إدارة متلازمة تكيس المبايض، مقدمة أحدث الأدلة للعلاج السريري، مع التأكيد على أهمية التدخل المبكر للحد من المضاعفات طويلة المدى، مثل داء السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية. تغيير نمط الحياة يُعتبر العلاج المفضل، بينما يُعدّ التحسس للأنسولين خياراً علاجياً واعداً.