

يقع حوض وادي الاسيوطي في الجزء الغربي من وسط الصحراء الشرقية ويمتد باتجاه عام من الشرق الى الغرب حيث يفصل خط الاستواء المياه الرئيسي بالصحراء الشرقية بينه وبين وادي قنا ويتجه لوادي الرئيسي غربا نحو نهر النيل جنوب اسيوط بنحو 10 كم ويمتد بين دائرتين عرض 27 7 ش ، ويمتد حوض وادي الاسيوطي في شكل غير متناسق بسبب الظروف البنوية والمناخية التي تحكمته بدرجة كبيرة في تطور شبكة تصريفية تتبع خط تقسيم المياه بداية من شمال المصب شرق وادي النيل نجد انه يتجه جنوب الشرق متمشيا مع تلال يتراوح ارتفاعها بين 120 الي 300 متر وذلك لمسافة تصل الي 29 كم ثم ينحني نحو الشمال في تفرج حاد متمشيا مع تلال يتراوح ارتفاعها بين 300 الي 320 متر ويجري فوق الحجر الجيري الاسيوني الاوسط لمسافة تصل الي 21 كم ثم يتجه صوب الشرق فاصلا حوض التصريف ويجري نحو 42 كم شبكة التصريف لحوض وادي الاسيوطي:-

تمتد شبكة التصريف لحوض وادي الاسيوطي بصفة عامة من الشرق للغرب باتجاه نهر النيل وقد اظهرت القياسات المورفومترية أن الحوض ينتهي بالرتبة التاسعة وتتميز شبكة التصريف بتباين كثافتها تبعا لاختلاف في خصائص التكوينات الجيولوجية والصور البنائية للحوض وتتكون شبكة التصريف بحوض وادي الاسيوطي من التقاء شبكات تصريف ثلاثة أودية رئيسية متماثلة الرتبة وهي : 1- حوض وادي الاسيوطي الأعلى :- ويمتد باتجاه عام من الشرق للغرب ويحتل معظم الجزء الشمالي الشرقي من الحوض وتصل مساحته الي 265.8 كم مربع بنسبة 43% من جملة مساحة الحوض ويجري فوق تكوينات الحجر الجيري الاسيوني الاسفل ويلتقي بالمجري الرئيسي عند خط طول 31 35 ق علي بعد 29 كم من مصب وادي الاسيوطي 2- حوض وادي اتلة الميت :- ويمتد باتجاه عام من الشمال الي الجنوب ويقع في الجزء الشمالي الغربي من الحوض وتبلغ مساحته نحو 571 كم مربع بنسبة 25.3- حوض وادي حبيب :- يمتد باتجاه عام من الشرق الى الغرب ويقع في الجزء الجنوبي من حوض وادي الاسيوطي وتصل مساحته نحو 133 كيلومتر مربع بنسبة 21.8 % من جملة مساحه حوض وادي الاسيوطي ويجري فوق الحجر الجيري الاسيوني الاسفل ويلتقي واديه بالمجرى الرئيسي عند خط طول 31 21 ق على بعد 21 كيلو متر من مصب وادي الاسيوطي رابعا اسباب اختيار الموضوع (حوض وادي الاسيوطي فيما يلي):- 1- رغبة الطالب في الدراسة الجيومورفولوجية 2- يعد حوض وادي الاسيوطي من الاحواض الهامة على نهر النيل والتي لم تحط بدراسه جيومورفولوجيه من قبل 4- امكانه الوصول الى منطقته الدراسه لإجراء الدراسه الميدانيه حيث تبعد عن مدينه اسيوط نحو 1 كيلومتر 5- توفير الخرائط الجيومورفولوجيه والطبوغرافية هذا فضلا عن خرائط الميوزك التي تغطي حوض وادي الاسيوطي وهي من اهم مصادر البيانات من حيث البحث خامسا اهداف البحث:- يمثل الهدف الرئيسي للبحث في رسم خريطه الجيومورفولوجيه لحوض وادي الاسيوطي التعرف علي اهم خصائص السطح به تمهيدا للاستغلال الاقتصادي الامثل او في سبيل تحقيق هذا الهدف كان امام الطالب عدة اهداف مرحلية تتمثل في الاتي :- دراسه الخصائص الجيولوجيه ، التعرف علي اهم العوامل والعمليات التي شكلت سطح الحوض قديما وحديثا وذلك من خلال دراسته الاثار الجيومورفولوجيه لعناصر المناخ الحالي والتي تمثلت في (حراره ورطوبه و رياح وامطار) الوقوف على اهم الخصائص الحوض الشكلي و التضاريسيه بالاضافه الى خصائص التصريف ومدى اهميتها في عمليه التاريخ الجيومورفولوجي للحوض ومراحل تطوره دراسه أهم خصائص شبكه التصريف من حيث انماطها واعداد مجاريها واطوالها وعلاقتها بالتكوينات الصخرية في حوض وادي الاسيوطي ودراسه اهم خصائص المنحدرات بالحوض و تحديد مدلوله الجيومورفولوجيه وما تشيراليه مراحل التطور التي تعرض لها الفصل الاول جيولوجيه حوض وادي الاسيوطي مقدمه:- يتناول هذا الفصل دراسة جيولوجيه حوض وادي الاسيوطي بحيث يتم من خلالها التعرف على التكوينات الجيولوجيه وخصائصها وتوزيعها هذا فضلا عن دراسه الصور البنائية و تطور الجيولوجي للحوض اولا التكوينات الجيولوجيه حيث يمكن ملاحظه ما يلي:- 1- ترجع تكوينات الحوض الى الزمن الثالث والرابع وجميعها صخور رسوبية 2- تمثل رواسب الايوسين أقدم الصخور السطحية مما يشير الى الحوض كأن ضمن المناطق التي تعرضت للضمور البحري خلال هذا العصر الذي امتد حتى دائره عرض 25 درجه شمالا 4- وجود رواسب عصر البلايوسين في الاجزاء الدنيا من حوض وادي الاسيوطي على جانبي المجرى الرئيسي ما يدل على حدوث غمر غير غطائي على الخليج النيلي حتى دائره اسنا ومن ثم البحر البلايوسيني الى الاجزاء الادنى من الحوض ثانيا تكوينات الزمن الثالث:- - تكوينات الايوسين:- اقدم التكوينات الجيولوجيه في هذا الحوض واكثرها انتشارا وتقسم الى:- - تكوينات الايوسين المبكر: تمثل في تكوينات درنكة وسري حيث يمثل تكوين درنكه في الحجر الجيري وذلك في تتابع طبقي عباره عن وحده سفلي يصل سمكها الى 360 متر تتكون في حجر جيري خالي من الحفريات وحده عليا تصل سمكها الى 170 متر تتكون من الحجر الجيري الغني بالحفريات والوحده السفلي عباره عن ثلاث طبقات هي من اسفل الى

أعلى - حوض الايوسين الأوسط: - 49 % من المساحة الكلية للحوض ويجري فوقه روافد وادي قتله الميت - تكوين البلايوسين :- يشمل هذا التكوين مساحة صغيرة من حوض تمثل أقل من 1% من المساحة الكلية للحوض وهي شاغله الجزء الأدنى من المصب ويمثلها تكوين (كوم الشلول) ويتكون من رواسب الرمال والمعادن الطينية مع وجود عدسات رقيقة من الرمال المنعده المصدر في بعض المعادن الطينية مثل الجلوكت والبيريت والسدرت بالارتفاع الأعلى القطاع من التكوين نجد رواسب الحجر الرملي المارل والرواسب البحرية الغنية بالحفريات مع وجود طبقة من الكنجولوميت سمكها 3.5 م تفصل بين رواسب هذا العصر ورواسب العصر السابق له وتمثل هذه التكوينات الجانب الشمالي من الجزء الأدنى من الحوض 3 % من جملة مساحة الحوض أ - رواسب البلايوسين: - حصوه ، حصاء ، رمال وتتعدد بها دورات الترسيب وتختلف دورات الترسيب تبعاً للتغيرات المناخية التي مرت على الحوض وتشمل كل رواسب الهولوسين المبكر والأوسط: - رواسب الهولوسين المبكر تدمروا سقعا الأودية ورواسب المراوح الفيضيه ويتكون راسب المراوح الفيضيه للحوامديه عند مصاب بها وتختلف حجمه ارسابات ها وكذلك سوف وكذلك فاكهه حسب طول المجرى وعدد روافده او تنوع المراوح الفيضيه بين مخروطي الشكل والمستطيل في بعض الروافد ويتكون ارسابات المراوح الفيضيه من الحصى والزلط والحصاد والرمال الهولوسين الأوسط عباره عن اثبات رمليه حديثه قليله السمكه وتنتشر في نطاق الاراضي وتنتشر في نطاق الاراضي المستويه تظهر عليها علامات الرمال كما توجد عند ملتقى وادي الاسيوطي الاعلى مع وادي قتله الميت مكونه من كسبان رمليه طويله ثانيا التضاريس: - نتناول في هذا الفصل الخصائص التضاريسية لحوض وادي الاسيوطي من خلال تحليل خصائص الخريطة الكنتورية للحوض ونتعرف من خلالها على أهم الوحدات الكنتورية الرئيسة للمنطقة من خلال دراسة الخصائص التضاريسية والطولية ودرجة الانحدار والتضرس فضلا عن المنحني الهيسومتري لحوض وادي الاسيوطي وروافده الرئيسة أولا النطاقات التضاريسية: - يمثل حوض وادي الاسيوطي جزء من هضبة المعازة التي تمتد في الصحراء الشرقية وينقل الوادي من سطح الهضبة الى السهل الفيضي لنهر النيل ليلتقي في النهر وعلى هذا الأساس امكن تقسيم الحوض الى ثلاثة نطاقات رئيسية هي من الغرب الى الشرق كما يتضمن - نطاق السهل الفيضي ويضم السهل الفيضي لنهر النيل . نطاق سطح الهضبة . هو عبارة عن شريط ضيق مغطى بكميات كبيرة من الطمي التابع للهولوسين الرباعي ويعد أقل النطاقات التضاريسية مساحة حيث يمثل أقل من 1% من مساحة الحوض ويتراوح ارتفاعه بين 54 و60م فوق سطح البحر ، ويمثل التربة الزراعية في المنطقة ويقع جزء شرقي مناخم لنهر النيل ثانيا : نطاق السهل الفيضي لمجرى وادي الاسيوطي 4 % من جملة مساحة الحوض وياخذ شكل الامتداد الطولى يبلغ متوسط عرضه ١١/٠ كم وينحصر بين خطي كتور ٩٠م الى ١٩٠م فوق سطح البحر ، ويمثل إلتقاء نطاق السهل الفيضي لوادي الاسيوطي مع نطاق سطح الهضبة إنكسار واضح في اتجاه شمال غرب - جنوب شرق ، ومعظمها يتكون من الكولونجوميترات والرواسب الوديانية التابعة للعصر الرباعي مع وجود بعض التلال الصغيرة المبعثرة من الحجر الرملي والحجر الطيني التابعة لعصر البلايوسين ويمثل هذا النطاق الأرض التي تحاول المحافظة استصلاحها ، م ن ٩٣% من جملة مساحة الحوض ويمتد بين خطي كتور ٨٧٠ و ١٩٠م فوق سطح البحر وتوجد أعلى أجزاء هذا النطاق في أقصى الشمال الشرقي ويتميز سطح الهضبة بانحدار في اتجاهين أحدهما انحدار عام ناحية الغرب اثر على اتجاه مجارى حوض وادي السيوطي حيث يتجه في نهر النيل والانحدار الآخر اتجاه خفيف ناحية الجنوب أثر على اتجاه بعض الروافد مثل وادي إتله الميت ووادي قرد الفار ووادي الرجية ، و الأودية الكبيرة التي تقطع هذه الهضبة تكون عميقة و طويلة و شديدة الانحدار جيولوجية وادي الاسيوطي القديمة :- تعد التكوينات الماده الخام التي تتكون منها الاشكال الارضية وذلك فان اختلاف هذه التكوينات وتباين صلابتها من مكان الي اخر يؤدي إلي تباينة الاشكال الارضية ووادي الاسيوطي يتكون من عدة تكوينات جيولوجية يتراوح عمرها ما بين عصرين الايسونية وهذان عصور الزمن الثالث والحولوسين وهذا من زمن العصر الرابع وهذه العصور جميعها يتكون من الصخور الرسوبية ورواسب الايسونية تدل علي انها من اقدم الصخور السطحية لانها تعرضت للغمر البحري خلال هذا العصر ويوجد تكوينات اخري مثل الايجوسين والملوسين لم توجد فتكوينات وادي الاسيوطي حيث اقتصرت هذه العصور تكوينتها علي مناطق معينه من الاراضي المصرية واقتصر الغمر البحري الميوسيني علي مناطق شمال مصر مثل هضبة مارماركية الي جانب سواحل جليج السويس والبحر الاحمر وتعد تكوينات الابجوسينية قارية تقتصر علي مناطق محدوده مثل النطاق الرسوبي وجود رواسب عصر البليوسين في الاجزاء الدنيا من وادي الاسيوطي علي جانبي المجري الرئيسي ويدل ذلك ع حدوث غمر غير غطائي علي خليج النيل و تم وصول البحر البلايوسيني الي الجزء الأدنى من وادي الاسيوطي حيث تشغل تكوينات الزمن الثالث معظم مساحة وادي الاسيوطي لانها تغطي اكثر من 92% من المساحة الكلية لحوض وادي

الاسيوطي وتعد رواسب عصر الايوسيني اكثر الصخور السطحية انتشارا لانها تغطي اكثر من 91% من المساحة الكلية وتعض رواسب البلايسونية اقل من 1% من المساحة الكلية لحوض وادي الاسيوطي ونجد ان رواسب الزمن الرابع تمثل اقل من 8% من المساحة الكلية الزمن الثالث (الايوسين - البلايوسين) الزمن الرابع (البلايوسين - الهولوسين) 1- تكوينات الزمن الثالث الايوسين اقدم التكوينات الجيولوجية واكثرها انتشارا وتنقسم الي الايوسين المبكر والايوسين المبكر يتمثل في الدرنكه - سري ويتمثل تكوين الدرنكه في الحجر الجيري وذلك ف تتابع طبقي عباره عن وحده سفلي يصل سمكها الي 360 متر وتتكون من الحجر الجيري خالي من الحفريات وحده عليا يصل السمك الي 170 متر من الحجر الجيري الغني بالحفريات والوحده السفلي عباره عن ثلاث طبقات هي من اسفل لاعلي طبقة تباشير سمكها 97 متر ويعلوها طبقة حجر جيري سمكها 127 متر تحتوي علي تكوينات السيلكي والطبقة العليا عباره عم حجر جيري رمادي يميل الي اللون الاصفر بسمك 146 متر ويغطي هذا التكوين حوالي 4, أما تكوين (سري) فهو عبارة من صخور جيرية يتخللها بعض تكوينات من (الصوان) في صورة شرائح وأحيانا في صورة هوائية من الصخور الجيرية حيث الصخور الجيرية تتميز بالصلابة لاحتوائها على السيلكات وغنية بالحفريات الدقيقة في أجزائي السفلي ويغطي هذا التكوين حوالي 64% من مساحة الكلية حيث lucina the becd والحفريات الكبيرة أجزائها العليا Nummulites تجري فوق حوض وادي الأسويطي الاعلي ومعظم روافد وادي حبيب . 1- رواسب البلايوسينوسين :- تشمل رواسب المصاطب النهرية ورواسب حشو الوادي وهي تتمثل من الجزء الادني من الحوض وعلي جوانبها وعند مصبات الروافد وتتنوع علي جانبي المجري الرئيسي فيها الارسابات ما بين (رملية - حصوة - حصاء - رمال) وتعد بها دورات الترسيب وتختلف تبعاً للتغيرات المناخية التي مرت علي حوض وادي الاسيوطي وتتكون رواسب قاع الوادي من (الحصى - الحصباء - الرمل - المارل - الغرين) وصف تكوين ارمنت بانه يتكون من 10 أمتار من المارل المتطابق به الرمل او الطين الظاهرية حيث سجلت أقل درجات حرارة في المحطات الثلاثة (اسيوط ، ٩ و ذلك لوقوعها علي البحر الأحمر و بذلك تتميز منطقة الدراسة بمدي حراري كبير نسبيا بسبب مناخها الصحراوي و كذلك وجودها في نصف الكرة الشمالي حيث ترتفع درجات الحرارة في الصيف و تنخفض في الشتاء (6 أغسطس) علي الترتيب ثانيا الرطوبة النسبية:- مهما يكن الهواء جافا في الصحاري فانه لا يخلو من قدر يسير من بخار الماء الذي قد يتكاثف فوق الصخور التي يتم تبريدها اثناء الليل على هيئة ندى خصائص الرطوبة النسبية :- 1- يبلغ المعدل السنوي للرطوبة النسبية في المحطات الثلاثة (اسيوط - سوهاج - الغردقة) 41 % ، 46% على الترتيب) و يلاحظ انخفاض الرطوبة النسبية بصفة عامة الوقوع محطات الدراسة في النطاق الصحراوي باستثناء محطة الغردقة التي تقع على البحر مما يسمح للهواء بالتشبع بكمية من بخار الماء و كذلك زيادة كمية المطر نسبيا . 34 % أغسطس علي الترتيب السابق) و سبب ذلك ارتفاع درجة الحرارة و هبوب رياح الخماسين و عدم ثبات الهواء لفترة تكفي لتشبعه ببخار الماء . ثالثا الرياح أظهرت التجارب العملية أن هناك اريداد للرياح يحدث عكس الاتجاه العام لهبوبها وذلك لاحتكاكها بسطح الأرض (محسوب ، ١٩٩٧ ، ص ٢٩٧) فتعالج دراسة الرياح أهميتها في نشأة الكثير من الظواهرات الجيومورفولوجية في المناطق الصحراوية 3- ترتفع النسبة المئوية لحالات السكون في فصل الشتاء لتصل في محطات الدراسة إلى (50% يناير ، 9 ، الحد الأدنى السرعة الرياح القادرة على تذرية الفتات الدقيقة تمارس الرياح دورها التحات والرسوبي في حوض وادي السيوطي يساعدها في ذلك ارتفاع درجة الحرارة وندرة الأمطار وقلة الغطاء النباتي وقد تباين أثر الرياح على منطقة الدراسة حيث لوحظ أثناء الدراسة الميدانية أن الأودية ضيقة المجرى تحدث بها ثقب تشبه خلايا النحل في الجهة المواجهة للرياح بينما تنعدم الثقوب في الجهة الأخرى وتنتشر هذه الظاهرة في أودية قرد الفار والفرتلة وأبو نضال و عندما توازي الرياح الصخر تنتج ظاهرة حذوذ الأمتساح نتيجة ليونة الصخر وتنتشر هذه الظاهرة في أحواض وادي الشتاء والقليب الأسود وام يول .