

تعريف الخلية العصبية)العصبون(: هو الوحدة الأساسية للنسيج العصبي، وتتصف (Neurone 1) (الخلية العصبية) العصبون ومن حيث التركيب والوظائف فهو مشابه ،(conductibilité) (والنقل) excitabilité (فيزيولوجيا بصورة رئيسية بخاصيتي التنبيه لجسم الخلية العادية الا أن جسم الخلية العصبية يمكن أن يستقبل رسائل عصبية. (الشكل 1. (1-الشكل) 10 (أنموذج للخلية العصبية 1-1الدراسة النسيجية للخلية العصبية: يشتمل النسيج العصبي بصورة رئيسية على الخلايا العصبية المكونة أساسا من Névroglies (والخلايا الدعامية الدبقية) Fibres nerveuses (والألياف العصبية) Pericaryon (جسم الخلية العصبية والمحور) Dendrites (والتفرعات السيتوبلازمية) Pericoryon (العصبون من الأقسام الأساسية التالية وهي: الجسم الخلوي فالنقل يتم على الدوام باتجاه واحد من الاستطالات الممتدة من الجسم الخلوي إلى الجسم الخلوي). Axone neurite (الأسطواني ومن هذه الأخيرة إلى المحور الأسطواني إلى النهايات العصبية التي تشكل التفرعات النهائية للخلية العصبية.وقد يصعب عامة مشاهدة الخلية العصبية) العصبون (كمجموعة) أي جسم الخلية العصبية والمحور الأسطواني (الذي قد يبلغ من الطول أحيانا ما يزيد على 2-الشكل) 2) الأشكال المختلفة للنواة عشرة أمتار) كما هو الحال عند الحيتان الكبيرة. وتتم دراسة الجملة العصبية إما بواسطة المقاطع النسيجية التي تعطينا فكرة عامة مجملة أو بطرق نسيجية) Dissociation (بواسطة عزل وتفريق عناصرها خاصة بالجهاز العصبي باستعمال مواد معينة مثل بكرومات البوتاسيوم، أملاح الفضة، الفورمول وأزرق الميثيلين. كما يمكننا أن نميز عدة أشكال من العصبونات فمنها وحيد القطب وثنائية القطب ومتعددة الأقطاب، وعادة ما توجد هذه الأخيرة كنموذج للدراسة (وهي زوائد: Les dendrites (ارسة الخلوية للعصبون) الشكل 2) 1-2) الدراسة الخلوية للعصبون • الاستطالات السيتوبلازمية ذهنية على شكل تفرعات) شجي ارت (ويمكن أن يكون للعصبون آلاف الاستطالات التشجيرية ، هذه الأخيرة تمكن العصبون من الاتصال بعدد كبير من نهايات الخلايا العصبية أو في استقبالها للمعلومات أو المثيرات مباشرة ويختلف شكل وانتشار هذه الشجي ارت تبعا لنوع الخلية العصبية ، وهناك من يقدر عدد الاتصالات بين الخلايا في الدماغ إلى 15 أس14 وتشكل الشجي ارت معظم السطح المستقبل في العصبون، تتصل الاستطالات السيتوبلازمية (الهيولية) مباشرة بالجسم الخلوي ويتناقص قطرها اعتبارا من مكان اتصالها بالخلية العصبية، ولهذه الاستطالات بنية سيتوبلازمية غنية بالمكونات السيتوبلازمية. • المحور L'axone (ار من مكان اتصالها بالخلية العصبية، وهو امتداد مفرد يخرج من المخروط القاعدي للجسم الخلوي الذي يضيق ويصبح له قطر ثابت على طول امتداد المحور حتى التشعبات النهائية، ولا يتفرع المحور أو يتشعب أثناء مسيره وإنما قد يحمل امتدادات جانبية عمودية دقيقة، وظيفته الأساسية هي نقل السيالة العصبية التي تكون معلومات كهربائية-كيميائية من جسم الخلية إلى نهاية المحور، ويمكن أن يكون طول المحور أقل من واحد ملم إلى متر أو أكثر كما الحال في النورونات الحركية، وينتهي المحور بتفرعات نهائية تحمل نهاياتها حوصلات تحمل Le noyau: (حيث لا تتلامس الخلايا العصبية. • النواة) synapse (بداخلها النواقل العصبية والتي تفرزها في المشبك العصبي يكون غالبا شكلها مستديرا أو بيضويا وهي كبيرة الحجم بالنسبة للجسم الخلوي وتشتمل على نوية واضحة ضخمة أو نويتين، ويبدو السيتوبلازم كسائل لزج: Citoplasme) وتتصف النواة بأنها عالية اللزوجة وقليلة المادة الصبغية. • السيتوبلازم الهيولي (تسبح فيه كل المكونات الداخلية للجسم الخلوي والمحور الأسطواني وتشمل عناصر مختلفة أهمها: د 1 الجسيمات الكوندرية وتدعى المصورات الحيوية والميتوكوندري والتي تأخذ شكل عصيات أو حبيبات تتلون بشكل خاص: Condrosomes) جدارها مضاعف ، ATP (بالفوكسين الحامضي أو بأخضر جانوس، وهي مركز تشكيل الطاقة في الخلية وتخزينها على شكل مما يسمح لها بالتضاعف الذاتي، ويتكاثر عددها في الخلايا التي تنتج الطاقة بصورة عالية) ADN (، وتحمل في هيولها خيط من الذي يصعب مشاهدته في الخلية الحية ولكنه يلاحظ بوضوح عند: L'appareil de Golgi (كالخلايا العضلية. د 2 جهاز قولجي سنة 1915 وسماه باسمه سنة 1919 ويظهر هذا الجهاز إما على شكل Golgi، تثبيت الخلية بالحمض الأوسمي أو بأملاح الفضة الذي يستقبل المواد التي تنتجها الخلية) dictyosomes (شبكة متداخلة بخيط النواة أو بشكل جسيمات شبكية أو حوصلات كالبروتينات من الشبكة البلازمية الخشنة التي تتجمع في أطرافه ثم تنفصل على شكل حوصلات تفرزها الخلية أثناء الحاجة Corps de Nissl: (ويكثر وجوده في الخلايا ذات الطبيعة الإفازية كالخلايا الغدية) البنكرياس نموذجا. د 3 جسيمات نيسل وهي عناصر تسهل مشاهدتها بعد تثبيت النسيج العصبي بالكحول وتلوينه بملونات أساسية مثل أزرق الميثيلين أو أزرق التولويدين، وتبدو هذه العناصر على شكل كتل أو حبيبات ضخمة غير منتظمة مبعثرة في الجسم الخلوي وفي الاستطالات (السيتوبلازمية ولكنها لا تدخل إلى المحور الأسطواني) الشكل 2)، ولقد تبين إثر الدراسات المختلفة بواسطة التحليل الصبغي غنية جدا بالحمض) Brachet (أو بواسطة طريقة ب ارشيه) Casperson (وفقا لطريقة كاسبرسون) Spectro photometrie

التي توجد حرة في Les ribosomes (وكشفت الأبحاث الحديثة أن هذه الحبيبات هي الريبوزومات RNA) الريبوني النووي التي تربط بين جدار النواة Reticulum endoplasmique (السيوبلازم أو تتوضع على سطح الشبكة الأندوبلازمية الملساء والتي تعتبر امتدادا له في بعض الأحيان والعصيات الأخرى لجهاز قولجي)، كما أن الخلية العصبية تفقد هذه الجسيمات الريبية الذي يصل إلى مرحلة غير قابلة للعكس chromatolyse (الريبوزومات) تدريجيا ويطلق علي هذه الحالة اسم الانحلال اللوني تبعا لشدة التأثير أو التنبيه و مدته، وفي هذه الحالة تحصل حالات خطيرة من شلل أو آفات عصبية مختلفة. 4_ الليفات وهي تشكلات دقيقة خيطية لها قطر منتظم، توجد في جميع أجزء العصبون، ولا يمكن إظهارها (neurofibrilles) (العصبية بوضوح إلا بطرق معالجتها بأملاح الفضة ويبدو أنه تصعب رؤية الليفات العصبية في الخلية الحية ولكنه يمكن التحقق من وجودها بطرق متعددة بعد التثبيت وباستخدام المجهر المستقطب أو المجهر المتضاد الأطوار أو المجهر الإلكتروني، ولقد تبين من وإن (Neurofilaments) هذه الد ارسات أن الليفات العصبية تتألف من عناصر دقيقة جدا أطلق عليها الخيطيات العصبية تنتقل في (Influx nerveux) (توضع واتجاه الليفات العصبية المتوازي في المحور جعل بعض المؤلفين يعتقد أن السيالة العصبية هذه الليفات كانتقال التيار في الأسلاك، ولكن البعض الآخر يعتقد بأن هذا الانتقال يتم عن طريق التحولات الكيميائية وهذا الذي نميل إليه. 5_ المكتنفات الخاصة: وهي مكتنفات لا تشاهد في كل الخلايا العصبية، وهي تتألف من مواد مختلفة مثال الحبيبات الدهنية، حبيبات تتلون بالأحمر المعتدل، كميات قليلة من الجليكوجين، صبغات مختلفة منها الصبغات الخاصة السم اراء التي تشاهد بغ ازرة عند الشيوخ. وتقوم بعض الخلايا العصبية بإف ارز كميات غزيرة أحيانا من مواد (Locus niger) (والسوداء ذات طبيعة بروتينية مرتبطة مع عناصر أخرى، وتفرغ هذه المفرازت في الوسط الداخلي، وهذه الحادثة الكبيرة الأهمية تدعى وغالبا ما تتجمع الخلايا العصبية المفرزة في م اركز معينة، وقد شوهدت في (Neurosecretion) (ظاهرة الإف ارز العصبي المنطقة تحت السريرية) تحت المهاد) الدماغية التي تتصل بالغدة النخامية. 1-2 نمو وتمايز العصبون: (شكل 2-3) مراحل تمايز الخلايا العصبية متعددة الأقطاب- النخاع الشوكي- يتوقف العصبون عن الانقسام قبيل أو عند تمايزه وتدخل الخلايا العصبية فعند الانسان (Bizzozzero) (التي لا تنقسم وفقا لتصنيف بيزوزيرو) Cellules permanentes (المتمايزة في عداد الخلايا الدائمة مثلا تكون جميع الخلايا العصبية قد توقفت عن الانقسام قبل الولادة، ولا تتكون بعد ذلك خلايا عصبية جديدة كما لا توجد خلايا مدخرة أو خلايا استعاضة. فالحوادث الانقسامية لا تشاهد إذن إلا في الخلايا العصبية التي لم تتمايز بعد أو في الخلايا فمثلا إذا فحصنا العصبونات التي تدخل في تركيب النخاع الشوكي لجنين فتي نلاحظ فيها عدد (Cellules souches) (الجدعية من الانقسامات وذلك لأن الخلايا العصبية المؤلفة للمساحة العصبية ما ازلت غير متميزة. تكون النواة في الخلية وحيدة القطب وتشتمل السيوبلازم على RNA) (وفقيرة بالحمض الريبوني النووي DNA) (غنية بالحمض الريبوني النووي المنقوص الأكسجين العكس على كميات مختلفة من المواد الريبية النووية مع بروتينات ملونة بالملونات الحامضية، وفي الخلية كثيرة الأقطاب لقد أكدت هذه النتائج للد ارسات التي أجريت بالتحليل RNA) (في النواة وتشحن السيوبلازم بالحمض DNA) (تنخفض كمية لبعض أنواع العصبونات: أن لشكل العصبون أهمية كبيرة بالنسبة لبنية وفيزيولوجيا الجهاز العصبي، وتأخذ الأنماط الرئيسية وتأخذ (C. multipolaires) للخلايا العصبية أشكالا مختلفة، نذكر منها ما يلي: ● الخلايا العصبية المتعددة أو الكثيرة الأقطاب أشكالاً مختلفة نذكر منها الأنواع التالية: ● الخلايا المتعددة الأقطاب العادية: كما هو الحال في القرون الأمامية للنخاع الشوكي وفي شبكية العين. ● الخلايا الهرمية: كما هو الحال في قشرة المخ، وهي تأخذ شكلا هرميا و تغطي فيها الاستطالات السيوبلازمية تنحدر عن (Collaterales) (وتتشعب، وتختلف ودرجة تعقد هذه الخلايا، وتكون أشد تعقيدا عند الانسان وتحمل تفرعات جانبية كما هو الحال في عضو الشم التي تدخل استطالتها في اتصال) Cellules mitrales (المحور الأسطواني. ● الخلايا المص اربعة مع محاور الخلايا الحسية العصبية. ● الخلايا ذات المحور القصير: كما هو الحال في قشرة المخ، وتتميز بتنوع المحور بالقرب من كما هو الحال في المخيخ وقد أطلق عليها هذا الاسم لأنه تفرعات (Cellules a corbeilles) (منشئه. ● الخلايا ذات السلال كما هو الحال في) Cellules a crosses (على شكل سلال، ● الخلايا ذات القوس) Purkinji (محورها يحيط بخلايا بوركيخ الفصوص البصرية للعصافير، ويبدو المحور فيها وكأنه يصدر من الاستطالات ولكن اتجاه السيالة العصبية يبقى عاديا. ● خلايا التي تتوزع استطالتها وتشعب في نفس المستوى وتكون عمودية على محور خلايا طبقة (Cellules Purkunji) (بوركيخ وهي كثيرة الانتشار، C. bipolaires) (الحبيبات كما هو الحال في العقد العصبية بالعضلة القلبية. ● الخلايا العصبية ذات القطبين وهنا تأخذ الاستطالة المفردة شكل المحور ولكن اتجاه السيالة العصبية يميز بين القطبين بوضوح ونشاهد هذه الخلايا في العقد

السمعية. المادة الرمادية: عندما تلتقي الشهي ارت الدموية للأوعية الدموية مع أجسام الخلايا العصبية بشكل دائم تكون المادة الرمادية، لأن اللون الرمادي يكون من خصائصها. المنطقة الشبكية: فتحدث عندما تتشابك أجسام الخلايا ومحاور الخلايا معا. النواة العصبية: هي العدد الكبير من أجسام الخلايا العصبية مجتمعة مع بعضها بعضا) جمع نوى (وذلك بسبب منظرها التجمعي ويكون لها وظيفة معينة وغالبا يكون لونها رماديا. المسلك أو الممر العصبي: وهي تجمع كبير من المحاور الأسطوانية من نوى معينة وهي تقوم بحمل المعلومات من مكان لآخر مثل الممر البصري الذي يحمل المعلومات البصرية من العين إلى الدماغ، ولونها يكون أبيضاً. أسئلة للتقويم: 1_ عرف الخلية العصبية فيما لا يتعدى ثلاثة أسطر. 2_ أرسم نمودجا لخلية عصبية مع كتابة البيانات الأساسية. 2_ عدد الأشكال المختلفة للعصبونات مع تحديد أماكن تواجدها في أقسام الجملة العصبية. 4_ اشرح ثلاث مكونات للخلية العصبية. 4_ أذكر أنواع الخلايا متعددة الأقطاب مع تحديد أماكن تواجدها في النسيج العصبي. 2_ عرف المصطلحات الآتية: المادة البيضاء، المادة الرمادية، النوى العصبية، المسالك العصبية، المنطقة الشبكية. المحاضرة الثانية: الأهداف: 1_ أن يرسم رسماً تخطيطياً للليف عصبي Les fibres nerveuses & Les synapses 2_ أن يقرأ بين نوعي الألياف العصبية من ناحية المكونات والوظيفة وأماكن تواجدها. 3_ أن يذكر الاستحالات العصبية المختلفة. 4_ أن يستنتج أي أقسام العصبون ضروريا لحياة الخلية من خلال الاستحالة الواليرية. 5_ أن يعرف المشبك العصبي. 6_ أن يحدد الاتصالات العصبية المختلفة مع ضرب أمثلة. 7_ أن يذكر النهايات العصبية المختلفة مع الألياف العصبية: يمكننا التمييز Les fibres nerveuses & Les synapses 1- ذكر آلية عملها. الألياف والاتصالات العصبية عند تشريح الجهاز العصبي بين نوعين رئيسيين من الأعصاب، فهناك الأعصاب مقاومة ببيضاء صدفية (ناصعة البياض) مثل الأعصاب الشوكية، وهناك أعصاب شفافة سريعة العطب غير لامعة) مثل الأعصاب الودية. ويتألف كل عصب من مجموعة من (الخيوط العصبية الدقيقة التي يطلق عليها اسم الألياف العصبية، يشمل النوع الأول من الأعصاب على ألياف عصبية ذات نخاعين Fibres ويشمل النوع الثاني منها على ألياف عصبية مجردة من النخاعين أو عديمة النخاعين أو غير منخعة) (Fibres a myéline شكل) 4) ألياف عصبية الأعلى منخعة، الأسفل غير منخعة 1- 1 الألياف ذات النخاعين: تتألف هذه 4-amyéliniques). الألياف من المحاور الأسطوانية للخلايا العصبية التي تكون محاطة بعناصر مختلفة يتم تمييزها كما يلي: تلتصق خلايا شوان المحاطة بطبقة رقيقة من السيتوبلازم على المحور الأسطواني ومن ثم تتخون وتتشكل بينها وبين المحور غمد النخاعين، ويفصل ونجد بين (Etrangement de Ranvier (بين خلايا شوان) التي تؤلف مختلطاً خلويًا اختناقات ضيقة تدعى اختناقات رانفير هذه الاختناقات شقوق مائلة تملؤها السيتوبلازم تخترق غمد النخاعين وتصل إلى المحور الأسطواني يطلق اسم شقوق "شميث- ويحيط بالمجموع غمد ضام من نسيج متوسط مي ازنشيبي يمر فيه البلغم) غمد هانلي Schmidt-Lantermann "لانترمان والنخاعين الذي يميز هذا النوع من الأعصاب هو عبارة عن مادة دهنية بروتينية تسود بحمض الأسميوم وتنتفخ بتماس (Henlé وأصلها في الأعصاب المحيطية بفرز من قبل خلايا غمد شوان التي تحيط بالمحور، imbibition (الماء بحادثة التشرب الأسطواني، حيث بين الفحص بالمجهر الإلكتروني أن خلايا شوان تلتف حول المحور الأسطواني وتتكثف لتكون غمد النخاعين وينحصر السيتوبلازم والنواة بخلية شوان مكونة غمد شوان وبين كل خلية شوان وأخرى تتشكل عقد رانفير على طول المحور الأسطواني، وأما غمد النخاعين في الم أركز العصبية في منطقة المادة البيضاء فقد دلت الد ارسات أنها تتشكل من خلايا الدبق العصبي، ويتشكل هذا الغمد بصورة متأخرة نسبياً عند الثدييات والانسان) قبل الولادة قد يمتد إلى الأيام الأولى بعد الولادة حتى ثلاث سنوات. 2- شكل) 6) تشكل غمد النخاعين من خلال خلية شوان 1- 2- الألياف عديمة النخاعين: وهي الألياف غير المنخعة ونجدها بكثرة في المادة الرمادية للم أركز العصبية الودية وألياف العصب الشمي، (Fibre de Rimak (وتدعى أيضاً بألياف ريماك ونشير أن المحور الأسطواني عند استطالته من الخلية العصبية في المادة الرمادية يكون عارياً من أي غمد) (الألياف العادية)، وكذلك عند نهاية الليف العصبي. وتتعلق شدة المنبه وعتبة التنبيه وسرعة السيالة العصبية بغمد النخاعين في حالة وجوده أو عدم وجوده dégénérescence أو سمكه، وهذا ما يعكس سرعة السيالة والاستجابة بين الأطفال والكهول. 2_ حوادث الاستحالة العصبية يؤدي قطع العصب أو قطع الليف العصبي إلى استحالة وضمور الجزء المحيطي المنفصل عن جسم الخلية العصبية، nerveuse وتحصل الاستحالة بالنسبة للألياف ذات النخاعين على م ارجل ودرجات. تصيب طرفي القطع ولكن بمسافات قصيرة. الاستحالة تبدأ من مكان القطع حتى نهاية الليف العصبي، وتميز ثلاث أنواع من الاتصالات: • اتصالات بين d. wallerienne الفاليرية وهي الاتصالات التي تحصل بين التشعبات النهائية للمحاور الأسطوانية وبين استطالات أو الجسم : s.internorinales عصبية

وهي الاتصالات التي تتم بين العصبون s.efferentes للخلايا العصبية التالية أو المجاورة. • اتصالات منفذة أو فاعلة وتتم : s.receptives وبين العضلات أو الخلايا المفردة مثلا.5-) شكل 7) الاتصالات العصبية بين الخلايا • اتصالات مستقبلية بين خلية حسية وبين عنصر عصبي أما الاتصالات بين العصبية فتتحقق إما بتمفصل الفريقيين أو بتماسهما وباستم ارهما تبعا لأنماط مختلفة، أما الاتصالات الفاعلة من النوع العصبي العضلي فتتم بين التشعبات النهائية للألياف العصبية وبين الألياف العضلية، فلدينا هنا نهايات عصبية لأعصاب نابذة، أي تنقل السيالة العصبية من المركز إلى المحيط وفي مستوى العضلات المحركة. أما الاتصالات المستقبلية فتحصل بين التشعبات الوحشية للأعصاب الحسية وبين العناصر المحيطة بها وذلك لتكوين جهاز مستقبل يجمع ويتلقى التنبيهات الخارجية لتنتقل إلى العقد والمركز العصبي فإذا كانت هذه الاتصالات تبدو تشريحا وكأنها نهايات عصبية فهي من الناحية الفيزيولوجية بدايات عصبية، والألياف التي تدخل في تكوينها هي بمثابة استطالات سيتوبلازمية plaques لخلايا العقد والمركز العصبي. الاتصالات العصبية العضلية: وهي الاتصالات المعروفة والتي تشكل اللوحات المحركة ولدينا في مثل هذه الحالات اتصال بين نهاية ليف عصبي الآتي Fuseau neuro – musculaire والمغازل العصبية motorices من المحور الدماغي الشوكي وليف عضلي مخطط. أ- المغزل العصبي: وهنا يسير فرع من الليف العصبي بصورة موازية 9) الشكل 8) المغزل العصبي للمحور العضلي محتفظا بغمدته، ثم يفقد غمد النخاعين ويلتف حول الليف العضلي. ب- اللوحة المحركة: وفيها يرد الليف العصبي إلى وسط الليف العضلي بصورة مائلة غالبا، وهنا يفقد غمد النخاعين وتتشعب نهاية المحور الأسطواناني على شكل تفصصات في البروتوبلازما العضلية التي تكون مجردة في هذا المستوى من التمايز النيرة والعائمة مع ltenle الخاصة بالعضلات المخططة ويلتحم غمد 1-) الشكل 9) اللوحة المحركة الليف العصبي الضام الخارجي) غمد وتشكل نوبغمد هائلة في محيط اللوحة المحركة ما يدعى بالنوى الهامشية) myolemma (غشاء الليف العضلي