

اضطرابات الاكل هي أمراض معقدة لها أسباب متعددة العوامل وفقاً للنسخة النصية من الدليل التشخيصي والإحصائي الصادر عن منظمة (CD-11) والتصنيف الدولي للأمراض والمشاكل الصحية ذات الصلة (DSM-5-TR) للاضطرابات العقلية تهدف هذه الدراسة إلى مراجعة ومناقشة الأمراض المصاحبة لاضطرابات الاكل مع تلك الأمراض (CD-11) الصحة العالمية الأيضية ، الفئة العمرية المستهدفة البالغين تتراوح أعمارهم من ١٨ فما فوق ، ان الأنواع الرئيسية لاضطرابات الاكل: تشمل فقدان الشهية العصبي ، اضطراب الشراهة عند تناول الطعام ، يتزايد انتشار اضطرابات الاكل على مستوى العالم بشكل مثير للقلق ، بدانة إلى جانب الأمراض المصاحبة النفسية، من بينها، ستركز هذه الورقة على السمنة ومرض السكري ومتلازمة التمثيل الغذائي. على سبيل المثال، كان المراهقون الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة معرضين لخطر BED. من ناحية، خاصة بالنسبة لمتزايد للإصابة باضطرابات الأكل (28.2٪ أعلى مع زيادة الوزن و33٪ أعلى مع السمنة) من أولئك الذين لا يعانون من زيادة الوزن أو السمنة [1]. في ورقة مراجعة، كان لدى الأفراد الذين يبحثون عن علاج للتحكم في الوزن انتشار بنسبة 30٪ لاضطرابات الأكل [2]. من بين مرضى جراحة السمنة، يتراوح أولئك الذين يستوفون التشخيص السريري للسريير من 4. من ناحية أخرى، لوحظ مرض BED في دراسة أخرى، يقترب انتشار السمنة مدى الحياة من 90٪ في مرضى BN. و BED معدل سمنة أعلى بين مرضى أكثر عرضة مرتين للإصابة باضطرابات الأكل من أولئك الذين لا يعانون T1DM السكري 42، الفتيات المراهقات المصابات ب من داء الشيمن، بسبب الخوف من زيادة الوزن باستخدام علاج الأنسولين [43]. T1DM غالباً ما يعاني مرضى [42] T1DM من علاوة على ذلك، يرتبط 40-60٪ من انتشار اضطرابات الأكل بالتوريت، بالإضافة إلى ذلك، في مجموعة من المرضى الذين يعانون تراوحت معدلات انتشار اضطراب (T2DM) واضطرابات الأكل، أبلغ 93. بالنسبة لمرضى السكري من النوع 2 T1DM من الأكل على نطاق واسع من 1.4٪ إلى 25٪، ربما بسبب الاختلافات في معايير خصائص العينة والإعداد تؤثر سلوكيات الأكل المرضى المشتركون لديهم مؤشر كتلة جسم أعلى [46] T2DM المضطربة على ما يصل إلى 40٪ من المرضى الذين يعانون من عن ضعف الكفاءة الذاتية لمتابعة T2DM بدون سريير من المرجح أن يبلغ الأفراد المصابون ب T2DM مقارنة بمرضى ،التوصيات الغذائية التي وضعها الخبراء، بدلا من التناوب بين السريير ومتلازمة الأكل الليلي بالإضافة إلى ذلك