

رهدفت الدراسة الحالية الى الكشف عن العلاقة بين مستوى الفعالية الذاتية واضطراب التكتّم لدى النساء المصابات بسرطان الثدي، بالاعتماد على المزوجة بين المنهج الوصفي (الدراسة الاستطلاعية) و المنهج العيادي القائم على دراسة الحالة (الدراسة الأساسية) ، حيث تكونت عينة الدراسة من 10 نساء مصابات بسرطان الثدي في الدراسة الاستطلاعية واختيار 04 حالات منها في ومقياس توريننتو (1986) schwarzer & Jjenrusalem-10-GES الدراسة الاساسية، من خلال تطبيق مقياس الفعالية الذاتية تمثلت اهم النتائج كما يلي: 1. لا توجد فروق في مستوى الفعالية الذاتية bageby & parker (1994) TAS-20 . للالكسيثيميا لدى النساء المصابات بسرطان الثدي تعزى إلى الحالة الاجتماعية (عازبة، 2. _ لا توجد فروق في مستوى الفعالية الذاتية لدى النساء المصابات بسرطان الثدي تعزى إلى المستوى التعليمي (متوسط، 3. _ لا توجد فروق في مستوى الفعالية الذاتية لدى النساء المصابات بسرطان الثدي تعزى إلى السن. 4. _ توجد علاقة ارتباطية بين مستوى الفعالية الذاتية و مستوى التكتّم لدى النساء المصابات بسرطان الثدي. 5. _ لا توجد فروق في مستوى التكتّم لدى النساء المصابات بسرطان الثدي تعزى إلى الحالة الاجتماعية (عازبة، أرملة) لصالح العاملات. 6. _ توجد فروق في مستوى التكتّم لدى النساء المصابات بسرطان الثدي تعزى إلى المستوى التعليمي (متوسط، 7. _ توجد فروق في مستوى التكتّم لدى النساء المصابات بسرطان الثدي تعزى إلى السن. الكلمات "المفتاحية: الفعالية الذاتية، اضطراب التكتّم" الالكسيثيميا